



## Patiënteninformatie Hysterosalpingografie (HSG)

### Algemeen

Met deze folder wil het Maastad Ziekenhuis u informeren over een Hysterosalpingografie (HSG). Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest. Het kan zijn dat niet alles in de folder zo gaat als staat beschreven. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

### Wat is een HSG?

Een Hysterosalpingografie (HSG) is een onderzoek van de baarmoeder en de eileiders. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een zo laag mogelijke dosis röntgenstralen.

### Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek kijken we of er afwijkingen zijn aan de baarmoederholte. Daarnaast kijken we ook of de eileiders open zijn.

### Zwangerschap

Als het mogelijk is dat u zwanger bent, neem dan contact op met uw arts voor overleg.

### Allergie

Voor dit onderzoek maken wij gebruik van een contrastmiddel. Sommige mensen zijn hiervoor overgevoelig en kunnen de volgende reacties krijgen: galbulten, rode vlekken op de huid en benauwdheid.

Als u bij eerder onderzoek met een jodiumhoudend contrastmiddel een (ernstige) allergische reactie heeft gehad, vragen wij u dit van tevoren aan ons en uw arts te melden. Zo kunnen wij eventuele voorzorgsmaatregelen nemen of kiest uw arts voor een ander onderzoek.

### Vorbereiding

- Wij adviseren u geen waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis.
- Wij adviseren u maandverband mee te nemen.

### Het onderzoek

De gynaecoloog brengt een spreider (eendenbek) in. Vervolgens ontsmet de gynaecoloog de schede en de baarmoeder. Er wordt een katheter (dun slangetje) in de baarmoeder geplaatst. Via dit slangetje wordt een contrastvloeistof in de baarmoeder en de eileiders gespoten. Soms is dit pijnlijk. De pijn trekt meestal snel weer weg. Er worden direct foto's gemaakt. Na het maken van de foto's verwijdert de gynaecoloog de katheter en is het onderzoek klaar.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

### Na het onderzoek

Het is mogelijk dat u enig bloedverlies via de vagina heeft. Het is verstandig om na het onderzoek maandverband te gebruiken. Ook kunt u wat pijn in de buik hebben. Het is daarom prettig als u iemand meeneemt om u te begeleiden.

Als u na het onderzoek koorts (meer dan 38 graden) krijgt moet u contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie via (010) 291 22 80.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw arts.

#### **Tot slot**

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of de radiodiagnostisch laborant(e). Daarnaast kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie via (010) 291 22 00.