

PATIËNTEN INFORMATIE

Sulfasalazine (Salazopyrine®)

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Uw behandelaar heeft u sulfasalazine voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Het is belangrijk dat u deze informatie en de bijsluiter van de apotheek goed doorleest.

Het effect van sulfasalazine

Met medicijnen is de oorzaak van reumatische aandoeningen niet weg te nemen. Wel zijn er medicijnen die deze aandoeningen rustiger maken, deze worden reumabestrijdende medicijnen of reumaremmers genoemd. Na enige tijd kunnen hierdoor klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten afnemen.

Sulfasalazine is zo'n medicijn. Het kan 2 tot 3 maanden duren voordat u merkt dat het begint te werken. Als u pijnstillers gebruikt kunt u deze blijven gebruiken. Helaas heeft het niet bij iedereen een gunstig effect. Als het bij u niet werkt of als u teveel last heeft van bijwerkingen, kan u in overleg met de behandelaar besluiten het gebruik van sulfasalazine stop te zetten.

Een andere naam voor sulfasalazine is salazopyrine. Sulfasalazine wordt behalve bij diverse vormen van reuma ook gebruikt bij chronische darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen

Meestal kunt u sulfasalazine in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Er zijn echter enkele medicijnen, zoals:

- Sommige antibiotica en ijzertabletten, die de werking van sulfasalazine beïnvloeden.
- Ook kan sulfasalazine de werking van bloedverduuners beïnvloeden.
- Dit geldt ook voor de combinatie van sulfasalazine met digoxine (harttabletten), foliumzuur (een vitamine) en tabletten bij diabetes mellitus (suikerziekte).

Vertel uw huisarts, specialist en de trombosedienst daarom altijd welke geneesmiddelen u gebruikt.

Manier van innemen

Sulfasalazine is een geneesmiddel in de vorm van tabletten van 500 mg. Sulfasalazine wordt meestal volgens een opbouwschema geslikt.

U kunt de tabletten het beste innemen tijdens de maaltijd, dus met voedsel, water of melk. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt. Als u tabletten vergeten bent in te nemen, neem deze dan op een later tijdstip op dezelfde dag in.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiters van de apotheek staan alle bijwerkingen van sulfasalazine vermeld die ooit zijn voorgekomen. De meest voorkomende zijn:

- Misselijkheid, hoofdpijn of duizeligheid, soms duifheid.
- Huiduitslag.
- Erge keelpijn in combinatie met koorts, regelmatig een bloedneus en snel blauwe plekken krijgen (allemaal tekenen van een stoornis in de bloedaanmaak).
- Verandering in uw stemming.
- Buikklachten.
- De urine kan een oranje- of roodachtige kleur krijgen. Dit is onschuldig en gaat vanzelf over als u de tabletten niet meer hoeft te slikken.

In sommige gevallen veroorzaakt sulfasalazine stoornissen in de werking van de lever, hier merkt u niets van. Wel kan dit aangetoond worden bij bloedonderzoek.

Neem contact op met uw behandelaar of huisarts bij:

- Huiduitslag.
- Erge keelpijn in combinatie met koorts.
- Herhaaldelijk een bloedneus.
- Snel blauwe plekken krijgen.

Als u veel last heeft van bijwerkingen, kunt u stoppen met het gebruik van sulfasalazine. Neem hierover contact op met de reumaverpleegkundige.

Als u ooit eerder een allergische reactie heeft gekregen op salicylaten zoals acetylsalicyzuur of op een sulfonamiden antibioticum zoals co-trimoxazol dan kunt u ook allergisch reageren op sulfasalazine. Raadpleeg in dat geval eerst uw arts of apotheker.

Controles

Om eventuele stoornissen in de werking van de lever en in de aanmaak van het bloed in een vroeg stadium te ontdekken, laat uw behandelaar regelmatig uw bloed onderzoeken. Dit gebeurt de eerste maanden meestal elke 2 tot 4 weken. Hierna vinden de controles minder vaak plaats.

De uitslag van de onderzoeken is na enkele dagen bij uw behandelaar bekend. U hoeft niet te bellen of langs te komen voor de uitslag. Uw behandelaar neemt contact met u op als de uitslag van de onderzoeken afwijkend is.

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Heb je een kindwens of ben je (onverwacht) zwanger, vertel dit dan aan je arts. Je arts beslist dan samen met jou wat je het beste aan je medicijngebruik kan veranderen als dat nodig is.

Sulfasalazine heeft geen invloed op de vruchtbaarheid van vrouwen. Het kan bij mannen echter een tijdelijke onvruchtbaarheid veroorzaken. Dit herstelt zich weer enkele maanden nadat het middel niet meer gebruikt wordt. Hoewel sulfasalazine waarschijnlijk veilig is voor het (ongeboren) kind, is het verstandig met uw behandelaar te overleggen als u een zwangerschap overweegt, al zwanger bent of als u borstvoeding geeft.

Aanvullende informatie

- Er is geen bezwaar tegen autorijden, fietsen , besturen van een scooter of machine tijdens het gebruik van sulfasalazine
- Wees voorzichtig met alcoholgebruik. In combinatie met het gebruik van sulfasalazine is de kans groter dat u maagklachten krijgt. Neem daarom niet meer dan één alcoholconsumptie per dag.
- Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.
- Als u tabletten overhoudt, lever deze dan in bij de apotheek. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd.

Vaccinaties

Als je begint met sulfasalazine raad je behandelend arts je waarschijnlijk aan om een jaarlijkse griep prik te nemen.

Heb je een andere vaccinatie dan de griep nodig? Overleg dan altijd van tevoren met je specialist, apotheker of huisarts.

Heb je plannen om in de (nabije) toekomst een verre reis te maken? Als je op reis gaat heb je soms een inenting nodig. Gebruik je sulfasalazine dan is een inenting met een levend vaccin af te raden. Denk aan het bof-mazelen-rode hond- (BMR), gele koorts- of poliovaccin. Bepaalde vaccins hebben minder effect als je sulfasalazine gebruikt.

Overleg met je arts wanneer voor jou het beste moment is om je te laten vaccineren/inenten. Eventueel moet je dan (tijdelijk) stoppen met je medicatie. Het is verstandig dit ruim van te voren te regelen.

Vragen?

Heeft u dringende vragen neem dan contact op met de polikliniek Reumatologie via (010) 291 22 05.

- Onze baliemedewerkers zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op dit telefoonnummer.
- Onze doktersassistenten zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 11.30 uur op ditzelfde telefoonnummer te bereiken voor dringende medisch inhoudelijke vragen.

Heeft de vraag **geen spoed**? Stel dan uw vraag via:

- Een e-consult op het patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis. U kunt met uw DigiD inloggen via onze website www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaasstadziekenhuis.
- De app BeterDichtbij (als u dit heeft geactiveerd). Lees meer over BeterDichtbij op www.maasstadziekenhuis.nl/beterdichtbij.nl.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

