

PATIËNTEN INFORMATIE

Azathioprine (Imuran®)

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis





Uw reumatoloog heeft u Azathioprine voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Lees daarom behalve deze folder ook de bijsluiter van de apotheek.

Het effect van Azathioprine

Met medicijnen is de oorzaak van reumatische aandoeningen niet weg te nemen. Wel zijn er medicijnen die deze aandoeningen rustiger kunnen maken, deze worden reuma bestrijdende medicijnen of reumaremmers genoemd. Na een tijdje kunnen hierdoor klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten afnemen. Azathioprine is zo'n medicijn. Het kan 2 tot 4 maanden duren voordat u merkt dat dit medicijn begint te werken.

Als u al pijnstillers gebruikt kunt u deze blijven gebruiken. Als Azathioprine een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang blijven gebruiken. Helaas heeft het niet bij iedereen een gunstig effect. Als het bij u niet werkt of als u teveel last heeft van bijwerkingen, kan de reumatoloog besluiten het gebruik van Azathioprine stop te zetten.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen

Meestal kunt u Azathioprine in combinatie met bijna alle medicijnen gebruiken. Als u Azathioprine gebruikt samen met Allopurool (bij jicht), past uw reumatoloog de dosering van Azathioprine aan.

Vertel daarom uw huisarts en specialist altijd welke medicijnen u gebruikt.

Manier van innemen

Azathioprine is een medicijn in de vorm van tabletten van 25 en 50 mg. Er worden meestal 2-3 tabletten van 50 mg per dag voorgeschreven. U kunt de tabletten innemen met voedsel of water. Melk of andere melkproducten kunnen invloed hebben op de werking en mogen pas 2 uur na de inname weer gebruikt worden. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of kauwt, maar heel inslikt.

Als u tabletten vergeten heeft in te nemen, neem deze dan op een later tijdstip op dezelfde dag in.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van Azathioprine vermeld die ooit zijn voorgekomen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- Maag- en darmklachten zoals een verminderde eetlust, een vol gevoel, misselijkheid en braken, of diarree.
- Huiduitslag.
- Overgevoeligheidsreacties zoals koorts, koude rillingen, spierpijn of een gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht).
- Erge keelpijn in combinatie met koorts, regelmatig een bloedneus en snel blauwe plekken krijgen (allemaal tekenen van een stoornis in de bloedaanmaak).

In sommige gevallen:

- Veroorzaakt Azathioprine stoornissen in de werking van de lever, hier merkt u niets van. Wel kan dit worden aangetoond met bloedonderzoek.

Neem contact op met uw reumatoloog of huisarts bij:

- Erge keelpijn in combinatie met koorts.
- Herhaaldelijk een bloedneus.
- Snel blauwe plekken krijgen.
- Koorts, koude rillingen, spierpijn of gele verkleuring van uw huid of ogen.

Als u last heeft van bijwerkingen, kunt u stoppen met het gebruik van Azathioprine. Schrijf dan wel op, op welke dag u bent gestopt en waarom. Neem bij twijfel contact op met uw reumatoloog.

Controles

Om mogelijke stoornissen in de werking van de lever en in de aanmaak van het bloed in een vroeg stadium te ontdekken, laat uw reumatoloog regelmatig uw bloed onderzoeken. Dit gebeurt de eerste periode meestal iedere 4 weken. Hierna vinden de controles minder vaak plaats.

De uitslag van de onderzoeken is na een aantal dagen bekend bij uw reumatoloog. U hoeft niet te bellen of langs te komen voor de uitslag. Er wordt contact met u opgenomen als de uitslag van de onderzoeken afwijkend is.

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend, heeft Azathioprine waarschijnlijk geen ongunstige invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Het is erg belangrijk om uw reumatoloog te informeren als u een zwangerschap overweegt of al zwanger bent.

Het is bekend dat Azathioprine veilig is voor het ongeboren kind en u kunt dit medicijn blijven gebruiken tijdens de zwangerschap. Het is wel belangrijk dat u onder strenge(re) controle blijft.

Mannen met een kinderwens kunnen Azathioprine blijven gebruiken.

U kunt beter geen Azathioprine gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn wordt namelijk in de moedermelk uitgescheiden. Overleg de situatie met uw reumatoloog.

Aanvullende informatie

Als u veel last heeft van misselijkheid en braken, neem de tabletten dan in vóór het slapen gaan. Meestal hebt u dan minder last van deze bijwerkingen.

- Wees voorzichtig met alcoholgebruik. In combinatie met het gebruik van Azathioprine is de kans groter dat u stoornissen krijgt in de werking van de lever. Neem niet meer dan 1 alcoholconsumptie per dag.

- Bewaar medicijnen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.
- Als u tabletten over houdt, lever deze dan in bij de apotheek. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd.
- Wij adviseren u een medicijnlijstje bij te houden.

Vragen?

Heeft u dringende vragen neem dan contact op met de polikliniek Reumatologie via (010) 291 22 05.

- Onze baliemedewerkers zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op dit telefoonnummer.
- Onze doktersassistenten zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 11.30 uur op ditzelfde telefoonnummer te bereiken voor dringende medisch inhoudelijke vragen.

Heeft de vraag **geen spoed**? Stel dan uw vraag via:

- Een e-consult op het patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis. U kunt met uw DigiD inloggen via onze website www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaasstadziekenhuis.
- De app BeterDichtbij (als u dit heeft geactiveerd). Lees meer over BeterDichtbij op www.maasstadziekenhuis.nl/beterdichtbij.nl.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

