

PATIËNTEN
INFORMATIE

Blaasoperatie (TUR-blaas)

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over een blaasoperatie die we ook wel TUR-blaas noemen. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

Blaasoperatie

De afkorting TUR-blaas betekent Trans Uretrale Resectie van een afwijking in de blaas. Wat makkelijk gezegd 'het verwijderen van afwijkend blaasweefsel via de plasbuis' betekent.

Een afwijking kan bijvoorbeeld een blaastumor zijn. Blaastumoren kunnen goed- of kwaadaardig zijn. Om de juiste diagnose te stellen, is pathologisch onderzoek nodig.

Vorbereiding

Voor de operatie heeft u een afspraak bij de anesthesist. Zij verzorgen de pijnbestrijding/verdooving tijdens de operatie. De anesthesist vertelt u met welke thuismedicatie u (tijdelijk) moet stoppen en hoeveel uur u niet mag eten en drinken voor de operatie.

De dag van de operatie

U komt naar het ziekenhuis en meldt u bij de afdeling Patiëntenregistratie in de centrale hal.


Opnamelounge

Uw opname begint op de Opnamelounge. Dit is een rustige plek in het ziekenhuis waar we u voorbereiden op de operatie. Kijk voor meer informatie op www.maasstadziekenhuis.nl/opnamelounge.

Operatie

Voor de operatie begint krijgt u via een infuus verdoving of krijgt u een ruggenprik.

Bij deze operatie krijgt u via de plasbuis een operatie-instrument in uw blaas. Dit instrument heeft een kijkertje en een grijptertje/schraptertje. Zo kan de uroloog de binnenkant van de blaas schoon schraapt en het afwijkende weefsel zo goed mogelijk uit de blaas halen.



Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer.

Omdat de ingreep via de plasbuis plaatsvindt, ziet u na de operatie geen wond. In uw blaas is wel een 'wond'. Daarom spoelen we uw blaas uit.

Hoelang het spoelen duurt, hangt af van de kleur van de urine.

In het begin kan uw urine er nog bloederig uitzien.

Na het uitslapen gaat u naar de verpleegafdeling. U blijft minimaal 1 nacht slapen.

Aan het einde van de dag bouwen we het spoelen van de blaas af om te kijken of uw urineproductie ook zonder spoelingen goed verloopt. Als alles goed gaat, verwijderen we de volgende morgen om 06.00 uur de katheter. U moet dan veel drinken om daarna te kunnen plassen.

Na het verwijderen van de katheter moet u de urine opvangen. Na iedere plas roept u een verpleegkundige. De verpleegkundige controleert dan met een bladderscan of er niet te veel urine achterblijft in de blaas.

Als het plassen goed gaat en u geen pijn of koorts heeft en uw arts het goed vindt, mag u naar huis.

Complicaties

Bij iedere ingreep kunnen complicaties voorkomen. Gelukkig gebeurt het niet vaak, maar het is belangrijk dat u er van op de hoogte bent. De complicaties kunnen zijn:

- *Nabloeding.* Na de behandeling is het normaal dat u nog bloed tegenkomt in de urine. U heeft dan diepe donkerrode kleur met stolsels en/of plassen gaat moeizaam.
- *Blaasontsteking.* Na de operatie kunt u een branderig gevoel hebben tijdens het plassen. Dit is een normaal. Wanneer dit niet langzaam beter wordt en de urine troebel wordt, kunt u blaasontsteking hebben. Neem dan contact op met de polikliniek Urologie.
- *Gaatje in de blaaswand.* Hierdoor kan urine lekken in de buikholte, waardoor u buikpijn kunt ervaren na het verwijderen van de katheter, welke heviger kan worden tijdens plassen. In dit geval moet de katheter langer blijven zitten.

- *Ongewild urineverlies.* Dit verbetert meestal na een aantal weken.
- *Niet meer kunnen plassen wanneer de katheter er al uit is.*

Controle

U krijgt een afspraak mee voor een telefonische controle, ongeveer 2 weken na de operatie. Uw arts bespreek dan de uitslag van het weefselonderzoek en .

Adviezen voor thuis

De eerste 2 weken

- Geen zware lichamelijke inspanningen verrichten zoals zwaar tillen of fietsen.
- Geen alcohol / drugs gebruiken.
- Geen seks.

Na de 2 weken

- U mag geen auto besturen zolang u last heeft van pijnklachten en u medicijnen slikt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Controleer bij uw eigen autoverzekering of er aanvullende restricties zijn.

Wanneer moet u contact opnemen?

U moet contact opnemen als...

- u opeens hevige of aanhoudende buikpijn heeft die niet verdwijnt met 4x per dag paracetamol (1000 mg).
- u hevig bloedverlies (donkerrode en niet meer heldere urine) en er grote bloedstolsels in uw urine zetten.
- u opeens niet meer kunt plassen of u het gevoel heeft dat u niet goed uit kunt plassen.
- u koorts (boven de 38,5 graden) heeft.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel deze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige. De polikliniek Urologie is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 – 12.00 uur en tussen 13.00 – 16.00 uur te bereiken: (010) 291 22 65.

Vanaf 16.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u contact opnemen Spoedeisende Hulp (010) 291 35 99.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

