

PATIËNTEN INFORMATIE

Midazolam neusspray

Om een epileptische
aanval te stoppen

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



U of uw kind wordt behandeld met medicijnen om epileptische aanvallen te voorkomen. Soms krijgt u of uw kind toch een aanval ook al gebruikt u de medicijnen. De neuroloog of verpleegkundig specialist kan Midazolam neusspray voorschrijven als u of uw kind grote aanvallen heeft, die langer dan 5 minuten duren. In deze folder leest u hoe u de neusspray moet gebruiken.

Wat is Midazolam neusspray?

Midazolam neusspray is een medicijn dat gegeven kan worden wanneer een epileptische aanval niet vanzelf overgaat. De neusspray werkt snel om een aanval te stoppen. Midazolam neusspray lijkt op een gewone neusspray en is simpel te gebruiken.

Wanneer gebruiken?

Meestal gaat een aanval uit zichzelf over en hoeft u **geen** neusspray te gebruiken. De neuroloog of verpleegkundig specialist bespreekt met u wanneer u de neusspray **WEL** moet gebruiken. Dit kan zijn:

- Als een aanval na 5 minuten niet vanzelf overgaat.
- Als u of uw kind blauw ziet tijdens een aanval.

Uitzonderingen, die de neuroloog of verpleegkundig specialist met u bespreekt als dit voor u of uw kind geldt:

- In sommige gevallen moet de neusspray eerder dan 5 minuten gebruikt worden.

De neusspray kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld een serie aanvallen te doorbreken.

Hoe gebruiken?

Bespreek onderstaande instructies met mensen waar u of uw kind regelmatig mee omgaat. Zij moeten de neusspray geven als u of uw kind een aanval krijgt. Vertelt u hen ook waar zij de spray kunnen vinden wanneer dit nodig is.

- Verwijder de eventuele vergrendeling en het beschermdopje.



- Houdt het flesje rechtop zodat het opzuigslangetje in de vloeistof staat.
- Spray in de lucht totdat er een duidelijke nevel vrijkomt.
- Plaats het neusstuk in het neusgat zoals bij een normale neusspray.
- Druk de houders in, er is nu een spray gegeven.
- Plaats het neusstuk in het andere neusgat.
- Druk de houders in, er is nu nog een spray gegeven.
- Plaats de eventuele vergrendeling en het beschermdopje weer op de neusspray.
- Bewaar de neusspray op een donkere plaats op kamertemperatuur.

Via de link [Midazolam: hoe dient u het toe?](#) kunt u een filmpje van Epilepsie.nl bekijken over het gebruik van de Midazolam neusspray.

Let op: wanneer u de neusspray voor het eerst gebruikt, sprayt u eerst een aantal keer in de lucht totdat u ziet dat er vloeistof uit de neusspray komt.

De spray is beperkt houdbaar. Na openen is de spray 3 maanden houdbaar. Controleer regelmatig de houdbaarheidsdatum en vraag op tijd een nieuw recept aan bij uw neuroloog of verpleegkundig specialist.

Bijwerkingen

Na een aanval kunt u of uw kind slaperig zijn en last hebben van hoofdpijn, duizeligheid, geheugenverlies, opwinding, onrust, prikkelbaarheid en veranderd gedrag. Dit kan veroorzaakt worden door de epileptische aanval of door de Midazolam. Dit kan nog tot de volgende dag duren en gaat vanzelf over.

De gevaarlijkste bijwerking van Midazolam is demping van de ademhaling. U mag dus nooit meer van dit medicijn gebruiken dan uw neuroloog heeft voorgeschreven. Wanneer u uw kind Midazolam heeft gegeven, moet u 30 minuten bij uw kind blijven om de ademhaling te controleren. Tik uw kind aan als de ademhaling gedempt is, meestal is dit voldoende voor het kind om weer adem te halen.

De neusspray kan het neusslijmvlies prikkelen. Als u of uw kind erg verkouden is dan wordt de neusspray niet goed opgenomen. De neusspray kan dan in een wangzak gesprayd worden.

Gebruik geen alcohol na het gebruik van Midazolam. Dit kan de slaperigheid versterken.

Wat als een aanval na toediening niet overgaat?

Een epileptische aanval stopt vaak binnen een paar minuten. Midazolam werkt snel en het effect moet binnen 5 minuten optreden. Wanneer de Midazolam na 5 minuten niet werkt, mag u nogmaals Midazolam geven en u belt een ambulance.

Vragen

Wanneer u nog vragen hebt, kunt u uw vraag stellen via:

- Een e-consult op het patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis. U kunt met uw DigiD inloggen via onze website www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaasstadziekenhuis.
- De app BeterDichtbij (als u dit heeft geactiveerd). Lees meer over BeterDichtbij op www.maasstadziekenhuis.nl/beterdichtbij.nl.
- Aan de polikliniek Neurologie via (010) 291 22 35.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص مآ الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

