

PATIËNTEN INFORMATIE

Het gebruik van thiamazol (Strumazol)

Uw arts heeft u thiamazol (merknaam Strumazol) voorgeschreven. In deze folder leest u waar u op moet letten bij het gebruik hiervan.

Hoe werkt thiamazol?

Thiamazol wordt voorgeschreven bij een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie). De schildklier maakt dan te veel schildklierhormoon. Dit komt bijvoorbeeld voor bij de ziekte van Graves of bij een multinodulair struma, maar er zijn ook andere ziektebeelden waarbij dit voorgeschreven kan worden.

Thiamazol blokkeert de aanmaak van schildklierhormoon in de schildklier. Afhankelijk van de dosis wordt de aanmaak van hormoon geheel of gedeeltelijk geblokkeerd. Het duurt enkele weken voordat het effect maximaal is.

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Belangrijk om te weten is dat het gebruik van thiamazol kan leiden tot een zeer zeldzame, maar mogelijk zeer gevaarlijke bijwerking, agranulocytose genoemd (risico <0.1% ofwel minder dan 1 op 1000). Dit houdt in dat het beenmerg onvoldoende witte bloedcellen maakt, met als gevolg een verhoogd risico op ernstige infecties. Meestal presenteert agranulocytose zich als koorts en keelpijn. **Daarom adviseren wij u om bij koorts en keelpijn onmiddellijk contact op te nemen met uw behandelend arts.** Er wordt dan direct bloed afgenomen om de hoeveelheid witte bloedcellen te controleren.

Binnen kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek Interne Geneeskunde via (010) 291 22 20. Buiten kantoor tijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost in uw regio. Vermeld uw klachten en dat u thiamazol gebruikt. Als het aantal witte bloedcellen normaal is, dan kunt u het gebruik van thiamazol normaal voortzetten.

Verder kan door het gebruik van thiamazol een overgevoeligheidsreactie ontstaan, die zich meestal uit als jeukende huiduitslag. Meestal verbeteren deze klachten bij voortzetten van de behandeling. Ook gewrichtsklachten kunnen een bijwerking zijn.

Bij keelpijn en koorts (38.5 C of hoger), direct contact opnemen met uw behandelend arts of de huisartsenpost. Meld uw klachten en dat u thiamazol (Strumazol) gebruikt!

Telefoonnummer polikliniek Interne Geneeskunde: (010) 291 22 20.

Maasstad Ziekenhuis, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**
een santeon ziekenhuis

