

PATIËNTEN  
INFORMATIE

# Prostaat embolisatie

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



In deze folder leggen we uit hoe de behandeling verloopt. Hierbij wordt de algemene gang van zaken beschreven. Het is mogelijk dat in uw geval hiervan enigszins wordt afgeweken.

### **Wat is een embolisatie?**

Embolisatie is een behandeling op de afdeling Radiologie, waarbij de bloedvaten zichtbaar gemaakt worden door middel van contrastvloeistof. Met behulp van speciale katheters en materialen worden de bloedvaten dichtgemaakt.

### **Doel van het onderzoek**

Het doel van dit onderzoek is om bepaalde bloedvaten richting de prostaat dicht te maken.

### **Belangrijk om te weten voor de behandeling**

Indien u bekend bent met een aandoening van de nieren en/of overgevoelig bent voor jodium of contrastmiddelen wordt u verzocht dit via de verwijzend arts aan ons kenbaar te maken.

Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt mag u deze gewoon doorslikken.

### **Vorbereiding**

- Het is aan te raden om de liezen enkele dagen van te voren te scheren, dit in verband met de plakstrip die op de huid wordt geplakt, deze wordt aan het eind van het onderzoek verwijderd en trekt dan de haren mee.
- Het is prettig wanneer u kleding aanheeft waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken.
- Het is van belang dat u doorgaat met het nemen van de medicijnen die u normaal dagelijks gebruikt.

## Onderzoek en behandeling

Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich op de afdeling Dagbehandeling. Er worden een aantal vragen aan u gesteld en u krijgt een infuusnaaldje ingebracht waardoor via een druppelinfuus éénmalig antibiotica toegediend wordt. Daarna wordt u door een medewerker van patiëntenvervoer in uw bed naar de afdeling Radiologie gebracht. Aan het begin van het onderzoek vertellen de radiodiagnostisch laborant(e) en de interventieradioloog u nog een keer wat er gaat gebeuren. Als u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze gerust aan hen stellen.

U komt op uw rug op een onderzoekstafel te liggen; onder steriele lakens en uw liezen worden gedesinfecteerd. Daarna krijgt u een lokale verdoving in beide liezen. Door deze verdoving voelt u wel dat men bezig is, maar u ervaart minimale pijn. Door het inbrengen van een kleine katheter in de liesslagader aan beide kanten is er toegang tot de bloedvaten en kan men met behulp van contrast de bloedvaten afbeelden.

Contrastmiddel heeft als bijwerking dat men een warm gevoel kan ervaren, evenals een gevoel van plassen en een vieze smaak in de mond. Contrastmiddel richting de prostaat kan soms als brandend ervaren worden. Dit gevoel verdwijnt snel.

*Het is belangrijk dat u tijdens de behandeling heel stil blijft liggen*

Het totale onderzoek duurt in de meeste gevallen ongeveer twee uur, maar kan soms langer duren.

## Na het onderzoek

Na het beëindigen van het onderzoek en/of behandeling wordt de katheter verwijderd en het bloedvat gesloten met een inwendige hechting. Vervolgens moet u twee uur plat blijven liggen om de kans op een nabloeding zo klein mogelijk te maken. U wordt op een bed

overgebracht naar de afdeling Dagbehandeling.

Na de procedure moet u vier tot zes uur blijven liggen. Dit is afhankelijk van de behandeling die uitgevoerd is. De verpleegkundige controleert de prikplaats regelmatig.

Na de behandeling mag u weer gewoon eten en drinken. Het is zelfs belangrijk dat u veel drinkt (minstens twee liter vocht per dag) om zo snel mogelijk de contrastvloeistof weer uit te plassen.

Als alles goed gaat en de arts is langs geweest wordt het infuusnaaldje verwijderd en mag u naar huis. U krijgt vervolgspraken en recepten mee.

### **Risico's en complicaties**

Uw behandelend arts heeft de geringe kans op complicaties afgewogen tegen het te verwachten nut van de behandeling. Het team dat het onderzoek uitvoert, is gespecialiseerd in het voorkomen en behandelen van bijwerkingen van dergelijke onderzoeken. Een embolisatie van de prostaat is een veilige ingreep en verloopt meestal zonder problemen. Een enkele keer treden er bijverschijnselen (complicaties) op. Als dat bij u het geval is, wordt in overleg met u en uw behandelend arts besloten of en hoe er wordt overgegaan tot een behandeling van de complicatie.

#### ***Complicaties die kunnen voorkomen zijn:***

- Soms veroorzaakt het bewegen van de katheters een neiging tot flauwvallen (koud zweet, lage bloeddruk, tragere hartslag) Dit is gewoonlijk van korte duur;
- In de lies, waar de katheter wordt ingebracht kan in enkele gevallen een bloeuditstorting of een ontsteking ontstaan ten gevolge van de behandeling;
- Sommige patiënten (1 op de tien) krijgen rugpijn tijdens de behandeling, dat kan ongeveer twee dagen aanhouden. Indien u hier last van heeft, kunt u hier pijnstillers tegen gebruiken.

### *Contrastmiddel (Jodiumhoudend)*

Bij onderzoek wordt (een jodiumhoudend) contrastmiddel toegediend om de bloedvaten, organen en /of afwijkingen te kunnen beoordelen.

- Tijdens het inspuiten kunt u het kortdurend warm krijgen of zich een beetje misselijk voelen. Het inspuiten kan enigszins gevoelig zijn.
- In een klein aantal gevallen (minder dan 1%), komt een deel van de vloeistof buiten het bloedvat terecht. Dit heeft meestal geen ernstige gevolgen.
- Bij een klein aantal patiënten (minder dan 1 %) treedt een allergische reactie op het contrastmiddel op, die meestal bestaat uit niezen of het ontstaan van galbulten. Meestal behoeft dit geen verdere behandeling.

Indien u bij een eerder onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel een (ernstige) allergische reactie heeft gekregen, verzoeken wij u dringend dit tevoren aan ons en aan uw behandelend arts te melden, zodat eventuele voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen of gekozen kan worden voor een alternatief onderzoek. Deze informatie is van groot belang voor uw verdere behandeling.

### *Röntgenstraling*

Het onderzoek wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling, alleen wat nodig is voor kwalitatief goede opnamen. Uw behandelend arts en de radioloog wegen het nadeel van de röntgenstraling af tegen het voordeel van de informatie die het onderzoek kan opleveren.

### *Aandachtspunten*

Er is bloedverlies via de plasbuis mogelijk gedurende zes weken. Vermijd gedurende één week het verrichten van zware lichamelijke arbeid en druk verhogende momenten op de buik; de lies mag niet teveel belast worden.

### **Problemen**

Treed een van de onderstaande problemen op, neemt u dan contact op met de behandelend arts of de huisarts.

- Balanitis (ontsteking van het topje van de penis);
- Uitstralende pijn naar de anus;
- Verminderde doorbloeding van de penis/anus/blaas;
- Verkleuring van het topje van de penis;
- Branderig gevoel in de penis;
- Rood worden van de huid, jeuk en/of bultjes;
- Forse toename van pijn;
- Vies ruikende urine;
- Algehele malaise;
- Koorts boven 38.5 °C;
- Benauwdheid.

### **Uitslag**

De radioloog die de behandeling verricht heeft, brengt na de behandeling zo snel mogelijk verslag uit aan uw behandelend arts. De behandelend arts neemt na de behandeling of onderzoek de verdere zorg van de radioloog over. U mag verwachten dat de uitslag na twee werkdagen beschikbaar is.

### **Afzeggen onderzoek**

Mocht u om wat voor reden dan ook de afspraak op onze afdeling niet kunnen nakomen, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden aan onze afdeling.

Wij kunnen dan zo mogelijk een andere patiënt oproepen, zodat de onderzoekstijd niet verloren gaat.

Indien u het onderzoek op de afdeling Radiologie afzegt, dan verzoeken we u eveneens contact op te nemen met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

## Vragen

Als u nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of verpleegkundige.

De polikliniek Urologie is van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 12.00 uur en tussen 13.00 – 16.30 uur te bereiken via (010) 291 22 65.

Vanaf 16.30 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u contact opnemen met uw huisarts of de Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،  
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه  
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl) / [www.maaseniik.nl](http://www.maaseniik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

