

PATIËNTEN INFORMATIE

Video capsule endoscopie met Moviprep voorbereiding

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



In deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informatie geven over het onderzoek, de voorbereiding en de nazorg. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Doel van het onderzoek

Video capsule endoscopie (VCE) is een onderzoeksmethode waarbij het slijmvlies van de dunne darm wordt onderzocht met behulp van video-opnames. De camera in de videocapsule maakt tweemaal per seconde een foto van uw darm. De videocapsule weegt ongeveer 4 gram en is 11x27 millimeter groot. Deze opnames kunnen na afloop worden beoordeeld door de arts.

Medicijnen

- Indien u ijzer (staal)tabletten gebruikt is het noodzakelijk om daarmee 14 dagen van tevoren te stoppen. Na het onderzoek kunt u de ijzertabletten weer innemen.
- Als u diabetespatiënt bent overleg dan van tevoren met uw behandelend arts over het beleid.

Indien mogelijk heeft het de voorkeur dat u uw medicijnen inneemt na het onderzoek, overleg dit vooraf met uw behandelend arts. Mocht het niet mogelijk zijn uw medicijnen in te nemen na het onderzoek, neem deze dan minimaal 2 uur voor aanvang van het onderzoek in met een klein slokje water.

N.B. Indien u zwanger bent, kan het onderzoek alléén plaatsvinden na overleg met de MDL-arts. Meld dit tijdig aan uw behandelend arts.

Het onderzoek

U wordt binnengeroepen en begeleid door de endoscopie-assistent/ verpleegkundige, u krijgt een band om uw middel bevestigd. Deze wordt door middel van snoertjes aangesloten op een datarecorder. Voordat u de videocapsule inneemt krijgt u eerst een medicijncupje

met infacol te drinken, dit gaat schuimvorming in het maagdarmkanaal tegen. Vervolgens krijgt u de videocapsule te slikken met een klein beetje water.

Via de slokdarm en de maag belandt de videocapsule in de dunne darm. Op reis door de dunne darm naar de dikke darm, een tocht van 7 tot 8 uur, maakt de camera ongeveer 57.000 foto's. Gedurende het onderzoek blijft u in het ziekenhuis en krijgt u instructies mee van de endoscopie-assistent/verpleegkundige. Om vertraging van de capsule in de darm te voorkomen, is het van groot belang dat u veel in beweging blijft. Dit is mogelijk binnen ons ziekenhuis en eventueel de binnentuinen (met uitzondering van de afdeling Radiologie).

Het onderzoek duurt van 08.15 uur òf 08.45 tot ongeveer 16.00 uur. Wij adviseren u om een boek, tijdschrift, puzzelboekje of iets dergelijks mee te nemen.

Indien er zich storingen aan de apparatuur en/of lichamelijke klachten voordoen kunt u deze melden aan de endoscopie-assistent/verpleegkundige.

Vier uur na inname van de videocapsule mag u een kopje thee of koffie drinken en na zes uur krijgt u een lichte lunch aangeboden. Na acht uur wordt u losgekoppeld en worden de opnames overgezet.

Vorbereiding voor het laxeren

Bij uw eigen apotheek haalt u met het recept het laxeermiddel (Moviprep) en de Bisacodyl 4x 5mg. Het is mogelijk dat er een kleine eigen bijdrage wordt gevraagd voor de Bisacodyl.

Let op! De voorbereiding wijkt af van hetgeen op de bijsluiter staat vermeld. Houdt u zich alstublieft aan de volgende instructies en niet aan die van de apotheek/bijsluiter.

1 Week voorafgaand aan het onderzoek

Probeer 1 week voorafgaand aan het onderzoek voedingsmiddelen die pitjes, zaden etc. bevatten te vermijden,

Laxeerschema – dag vóór het onderzoek

Ontbijt Tussen **08.00 en 08.30 uur** nuttigt u een normaal ontbijt.

Lunch Tussen **12.00 uur en 12.30 uur** nuttigt u een licht verteerbare lunch. Deze bestaat uit twee beschuiten met jam (niet belegd met vleeswaren of kaas) en een kopje thee of koffie.

13.00 uur U maakt de eerste folie Moviprep klaar en drinkt dit in gedeeltes op vóór 16.00 uur. Na ieder glas Moviprep moet u nog 1 glas heldere vloeistof drinken. U drinkt dus één liter Moviprep en één liter heldere drank.

- Open de verpakking Moviprep
- Open 1 plastic folie met sachet A en sachet B
- Leeg zowel sachet A als sachet B in een lege kan en voeg 1 liter water toe
- Roer de oplossing tot het poeder geheel is opgelost. Dit kan 5 minuten duren.
- Giet de oplossing in een glas

16.00 uur U maakt de tweede liter Moviprep klaar en drinkt dit in gedeeltes op. Na ieder glas Moviprep moet u nog 1 glas heldere drank drinken.

Let op U drinkt deze middag dus vanaf 13.00 uur 4 liter vocht!

18.00 uur U neemt de 4x 5 mg Bisacodyl in.

Hierna mag u alleen nog **heldere dranken** drinken zoals:

- Koffie en thee eventueel met suiker (zonder melk)
- Appelsap
- Limonadesiroop
- Limonades zonder koolzuur
- (Mineraal)water zonder koolzuur
- Heldere bouillon (zonder vlees en groenten)

De dag van het onderzoek

Vanaf 24.00 uur op de avond **vóór** het onderzoek, mag u niets meer eten, drinken en/of roken.

Roken is tijdens het gehele onderzoek niet toegestaan. Wij raden u aan om ruimvallende tweedelige kleding te dragen, het liefst zonder riem met een metalen gesp. Aangezien de recorder om uw middel wordt gedragen. Gedurende het onderzoek mag u geen gebruik maken van elektronische apparaten zoals mobiele telefoon of laptop/ tablet en dergelijke.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek wordt de band met de datarecorder verwijderd en mag u weer alles eten en drinken. Wij verzoeken u de komende dagen uw ontlasting te controleren op de aanwezigheid van de videocapsule. Zodra de videocapsule het lichaam heeft verlaten, moet u zelf contact opnemen met het Maag-, Darm- en Levercentrum tijdens kantooruren.

Zijn er risico's aan het onderzoek verbonden?

Bij een niet voorziene vernauwing in darm kan het zijn dat de videocapsule vastloopt. Dit kan leiden tot misselijkheid, buikpijn en braken. In een enkel geval moet de videocapsule operatief verwijderd worden. Dit komt echter zeer zelden voor.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt door uw behandelend arts bij de eerstvolgende afspraak besproken.

Tot slot

Heeft u nog vragen over dit onderzoek, of mocht u na het onderzoek klachten krijgen die misschien te maken kunnen hebben met het onderzoek en/of ingreep dan kunt u contact opnemen met de balie van het Maag-, Darm- en Levercentrum van het Maasstad Ziekenhuis via (010) 291 17 77.

In dringende gevallen, buiten kantoortijd, kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-assistent Interne Geneeskunde. Deze is bereikbaar via de telefoniste van het Maasstad Ziekenhuis via (010) 291 19 11.

Het is van groot belang dat u op tijd aanwezig bent voor het onderzoek, anders wordt de uitslag hierdoor beïnvloed.

Het onderzoek kan helaas niet plaatsvinden wanneer u te laat bent. Er wordt dan een nieuwe afspraak met u gemaakt.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

