


PATIËNTEN
INFORMATIE

Hernia-operatie nek

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis






Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u enige uitleg geven over dit ziektebeeld en de behandeling. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. Indien u nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen aan uw arts, de verpleegkundigen of de fysiotherapeut.

Hernia, wat is dat

Een hernia treedt op in de wervelkolom. Deze bestaat uit een aantal beenderen (wervels). Tussen de wervels liggen de tussenwervelschijven, die belangrijk zijn voor het bewegen van de wervelkolom.



Ze bestaan uit een stevige omhulling (de annulus fibrosus) en een weke buigzame kern (de nucleus pulposus). Wanneer de harde omhulling een zwakke plek vertoont of scheurt, kan de weke kern naar buiten uitpuilen. Men spreekt dan van een 'hernia nuclei pulposi', voor het gemak afgekort tot 'hernia', het Latijnse woord voor uitstulping. De uitpuilende weke kern kan een zenuwwortel gaan beknellen, waardoor de pijn of uitval ontstaat.

Een zenuwwortel komt vanuit het ruggenmerg. Het ruggenmerg bevindt zich in het wervelkanaal, dat als een holle buis in de wervelkolom ligt. Het ruggenmerg geeft steeds ter hoogte van een wervel twee zenuwwortels af, waarvan één links en één rechts tussen de wervels door het wervelkanaal verlaat.

Onder de eerste / tweede lendenwervel is er geen ruggenmerg meer aanwezig. Hier lopen alleen zenuwwortels, afgegeven door het ruggenmerg erboven en wel in een bundel, de paardenstaart genoemd. Ook deze zenuwwortels verlaten tussen de wervels door het wervelkanaal.

Waar komt hernia voor

Een hernia komt meestal voor in de rug. Een hernia in de nek, zoals u die heeft, is relatief zeldzaam. Als nu de weke kern van een tussenwervelschijf uitpuilt en een wortel of het ruggenmerg bekneeld raakt, ontstaan uw klachten.

Wat zijn de verschijnselen

Deze kunnen nogal variëren, maar zijn meestal:

- Pijn of stijfheid van de nek.
- Pijnuitstraling in één arm, met pijn of tinteling in één of meerdere vingers. Typisch is dat de klachten worden verergerd bij draaiende en iets achterovergebogen bewegingen van de nek. Bij een ernstige beklemming kunnen tenslotte ook verlamingsverschijnselen of dove plekken ontstaan.
- De pijn kan soms zo heftig zijn, dat men de pijnlijke arm met de goede arm moet ondersteunen.

Welke behandelingen zijn mogelijk

Conservatief

Soms verdwijnen de klachten door een hernia vanzelf met rust en dus wordt in het algemeen eerst afgewacht.

Operatie

Is na enkele maanden geen verbetering opgetreden, dan kan een operatie gebeuren. Soms is deze binnen het verstrijken van de 'wachttermijn' nodig, bijvoorbeeld bij verergeren van de pijnklacht, of als er verlamingsverschijnselen aanwezig zijn.

De hernia operatie

Onderzoek voor de operatie

Één à twee weken voor uw operatie gaat u eerst naar de preoperatieve screening om goedgekeurd te worden voor de operatie. De anesthesist bekijkt of en welke onderzoeken (bijvoorbeeld bloedprikken, hartfilmpje) er eventueel nodig zijn.

De operatie

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. In tegenstelling tot de hernia in de rug vindt bij u de operatie plaats aan de voorzijde en wel naast en even onder de adamsappel.

Bij de operatie, die ongeveer twee uur duurt, worden de betreffende tussenwervelschijf en het in het wervelkanaal uitpuilende gedeelte (de hernia) weggehaald, waardoor de beknelde zenuw weer vrijkomt. Dat de tussenwervelschijf nu geen kern meer bezit, kan geen kwaad. Hoewel de twee wervels aan weerszijden van deze tussenwervelschijf nu iets minder ten opzichte van elkaar kunnen bewegen, zijn er nog voldoende schijven over voor een goede bewegingsmogelijkheid van de halswervelkolom.

Na de operatie

U komt bij uit de narcose, terwijl u op uw rug ligt. U verblijft een korte periode op de uitslaapkamer voor u weer naar de afdeling teruggaat. Nu, maar ook in de volgende dagen, moet als u op uw rug ligt het kussen worden doorgetrokken tot onder uw schouderbladen. U ligt dus als het ware met een 'gestrekte nek'. Daarna mag u afwisselend op de linker- en op de rechterzijde gaan liggen. De dag na de operatie wordt de wondpleister voor een nieuwe vervangen.

Complicaties

Bij iedere ingreep, hoe klein ook, kunnen complicaties voorkomen. Dit komt gelukkig niet vaak voor, maar het is belangrijk dat u ervan op de hoogte bent.

Vooral in de eerste dagen kan door de operatie de slokdarm wat opgezwollen zijn, wat u merkt aan het moeilijk doorzakken van het voedsel. Het zojuist ingeslikte stukje brood blijft als het ware hangen. Dit gaat over, maar het kan soms enige tijd duren.

Een andere veel gehoorde klacht is pijn tussen de schouderbladen; ook dit gaat in de regel over, al kan het soms zeer lang, soms maanden, aanwezig blijven.

De wond kan geïnfecteerd raken: u krijgt dan antibiotica en de wondgenezing duurt wat langer.

Een aantal ernstige complicaties zijn beschadigingen van slagader, stembandzenuw of slokdarm. Dit komt zeer zelden voor. Als u behoefte heeft aan uitleg hierover kunnen wij hier in een gesprek dieper op ingaan.

Wat gebeurt er verder

Dit wordt beschreven in het hierna volgende schema. Dit schema is bedoeld als richtlijn. Het kan best zijn dat de opeenvolgende activiteiten voor u wat langzamer of juist sneller gaan. De aanwezigheid van verlammingen kan een reden zijn om langer in het ziekenhuis te blijven. Ook als u wat ouder bent kan het langer duren.

Forceer niets, maar wees ook niet bang de nek te bewegen. U mag best bij het eten of bij het vastmaken van uw schoenveters naar beneden kijken, maar doorgaans zien wij u graag 'met uw neus in de wind lopen', en zoals gezegd bij liggen op de rug met het kussen doorgetrokken tot onder de schouderbladen.

Op de polikliniek heeft u de folder 'Thuis na een rug- of nekoperatie' gekregen. Hierin staan richtlijnen waaraan u zich het beste aan kunt houden na ontslag.

Schema

De eerste dag na de operatie en ontslag

's Morgens helpt de verpleegkundige u bij het uit bed komen, staan, lopen en zitten. Gaat een en ander goed, dan kunt u zittend aan tafel de maaltijden gebruiken.

Meestal zijn de armklachten verdwenen. Soms zijn de klachten al gedeeltelijk verdwenen, soms duurt dit langer en soms knappen de klachten niet op, ondanks dat er door de operatie ruimte is ontstaan voor de beknelde zenuw blijft deze dan klachten geven.

De eventuele tweede dag en thuis

Tijdens de rest van de opname, en wij adviseren het ook voor thuis, blijft het hoofdeinde van uw bed plat. Vaak mag u nu al naar huis, dit hangt af van het herstel.

Ontslag

U krijgt een telefonische afspraak na 14 dagen met de assistente mee, indien nodig wordt dit een afspraak om hechtingen te verwijderen. Ook krijgt u een controle afspraak bij de arts op de polikliniek na 6-8 weken. Aarzel niet en bespreek in deze tijd uw vragen en problemen met de arts.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

