

PATIËNTEN INFORMATIE

Whipple operatie

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



U wordt binnenkort opgenomen voor een Whipple operatie. Dit is een grote operatie waarbij een gespecialiseerd team voor u klaar staat. Deze brochure is gemaakt met het doel om u zo goed mogelijk te informeren over de zaken rond de operatie. Het kan voorkomen, dat het verloop bij u iets anders is dan in deze brochure staat beschreven. Roept deze brochure vragen op over uw behandeling, stel deze dan gerust aan uw specialist en/of verpleegkundige.

De operatie

Bij de Whipple operatie wordt de kop van de alvleesklier, deze ligt ongeveer in het midden van de buik samen met de twaalfvingerige darm, de galblaas en een deel van de galweg verwijderd. Ook wordt een gedeelte van de maag verwijderd. De lymfeklieren rondom de alvleesklier worden ook verwijderd. Het resterende stuk van de alvleesklier, de galweg en het resterende deel van de maag worden weer verbonden met de dunne darm.

Het kan zijn dat het niet mogelijk is om de tumor weg te halen. Bijvoorbeeld bij ingroei van de tumor in de bloedvaten of groei in andere organen. Soms is het niet zinvol om de tumor weg te halen, namelijk bij uitzaaiingen.

In beide gevallen zorgt de chirurg er in ieder geval voor dat de afvoer van gal en voeding ongestoord kan plaats vinden. Er wordt dan een omleiding gemaakt. Hierdoor verdwijnen eventuele geelheid en mogelijk ook passageklachten na de operatie.

Vorbereiding

(Bij)voeding

Als u in de periode voor de operatie veel afgevallen bent, is bijvoeding noodzakelijk om uw gewicht weer op niveau te brengen. Het is mogelijk dat u om deze reden al vóór de operatie naar een diëtist wordt verwezen.

Fysiotherapie

Om verlies van spiermassa en spierkracht tegen te gaan en longcomplicaties te voorkomen door middel van ademhalingsoefeningen wordt u om deze reden al vóór de operatie naar een fysiotherapeut verwezen.

Medicijnen

Neem bij opname altijd u eigen medicatie mee.

Dag van opname

U wordt één dag voor de operatie om 19.30 uur opgenomen in het Maastrad Ziekenhuis, op verpleegafdeling Chirurgie 2 (bouwdeel L, verdieping 2).

Eten en drinken

U mag op de dag voor de operatie tot 24.00 uur gewoon eten en drinken. U krijgt op de avond van opname een klysma en er wordt bloed geprikt. U krijgt dagelijks een injectie om trombose te voorkomen.

Dag van de operatie

Eten en drinken

Vanaf 24.00 uur mag u niet meer eten en /of drinken.

Pijnstilling

Voor de operatie kan de anesthesist een slangetje inbrengen of een injectie geven tussen de rugwervels. Daardoor is het mogelijk om op de plaats van de operatie de pijn lokaal te bestrijden. Door deze plaatselijke pijnstilling hoeft er tijdens de operatie veel minder morfine gebruikt te worden, zodat bijwerkingen van morfine, zoals sufheid en het stilvallen van de darmen, ook veel minder voorkomen. En dat bevordert een snel herstel. Bekijk ook film over anesthesie met de verschillende vormen op www.maastradziekenhuis.nl/filmanesthesie

Narcose

Naast de plaatselijke pijnstilling krijgt u ook algehele narcose. De dosering wordt precies op u afgestemd. U merkt hierdoor niets van de operatie en bent snel erna weer bij bewustzijn. De narcose werkt niet lang na, waardoor de tijd dat u op de uitslaapkamer verblijft normaal gesproken vrij kort is.

Na de operatie

Na de operatie verblijft u enige tijd op de uitslaapkamer (Recovery). U wordt naar de afdeling Intensive Care gebracht waar u één of meerdere dagen verblijft om daarna terug te gaan naar de verpleegafdeling Chirurgie voor verder herstel. De arts belt uw familie.

Direct na de operatie bent u door een aantal slangen verbonden met apparaten. Dat kunnen zijn:

- een infuus in de hals voor toediening van voeding, vocht en medicatie;
- een dun slangetje in uw rug voor pijnbestrijding
- een slangetje (sonde) in uw neus, dat via de slokdarm in de (resterende) maag ligt en ervoor zorgt dat het overtollige maagsap af kan lopen;
- één of meer slangetjes (drains) in uw buik voor afvoer van eventueel bloed en inwendig wondvocht;
- een blaaskatheter voor afloop van urine.

Naarmate u verder herstelt na de operatie, worden al deze hulpmiddelen verwijderd.

Voeding

Een goede voedingsconditie bevordert het herstel. Dagelijks bekijken de arts, verpleegkundigen en de diëtiste samen of u al weer wat kan eten of dat we het infuus gebruiken om u te voeden. In het begin kunt u nog niet zulke grote porties eten waardoor u onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Dit wordt langzaam opgebouwd via heldere vloeistoffen en vloeibare voeding, naar vaste voeding.

Pijnstilling

Naast de plaatselijke pijnstilling krijgt u ook vier keer per dag paracetamol. Het is belangrijk deze pijnstillers in te nemen. Ook als u geen pijn heeft! Een goede pijnstilling is van groot belang voor een goed herstel.

Bewegen

Bewegen is belangrijk om trombose (bloedstolselvorming) en longproblemen te voorkomen, maar ook om verlies van spierkracht tegen te gaan. Daardoor vermindert de kans op luchtweginfecties en verbetert de zuurstofvoorziening naar de wond, wat de genezing bevordert. De verpleegkundige begeleidt u bij het uit bed gaan.

Eerste dagen na de operatie

Een half rechtop zittende houding is na de operatie van belang. Op de Intensive Care of Medium Care helpen de verpleegkundigen u met wassen. Het operatieverband wordt verwijderd en de wond wordt bekeken. De verpleegkundige begeleidt u bij het uit bed komen op de stoel en de fysiotherapeut komt bij u langs voor ademhalingsondersteuning.

Als u lichamelijke toestand stabiel is, gaat u van de Intensive Care of Medium Care terug naar de verpleegafdeling Chirurgie. Het mobiliseren wordt uitgebreid met hulp van de verpleegkundige en de fysiotherapeut komt dagelijks bij u langs. Op de afdeling wordt dagelijks artsensite gelopen. Tijdens de artsensite maken de artsen afspraken over uw behandeling van die dag.

Volgende dagen

We streven ernaar om u de komende dagen zo snel mogelijk weer op de been te krijgen, zodat u naar huis kunt. In overleg met de arts wordt de pijnstilling aangepast en de blaaskatheter verwijderd.

Afhankelijk van de productie worden de andere drains verwijderd in overleg met de arts.

Veranderde spijsvertering en voeding

Na de operatie kunnen problemen met eten ontstaan. Soms zijn die problemen van tijdelijke aard, maar vaak zijn ze blijvend. U kunt, doordat een deel van het spijsverteringskanaal is verwijderd, last hebben van een verstoorde spijsvertering. Om dat er bij voorkeur een maagsparende Whipple operatie plaatsvindt, kan er een vertraagde maagontleding (tijdelijk) zorgen voor een opgeblazen gevoel en misselijkheid. Het advies is dan ook om vaker kleinere en niet te vette maaltijden te gebruiken. Rustig eten en goed kauwen kunnen de klachten ook verminderen. Soms is het nodig om na de operatie tijdelijk de voeding aan te vullen met sondevoeding, dieetpreparaten of drinkvoeding als u niet voldoende kan eten.

De alvleesklier maakt enzymen en een aantal hormonen aan, waaronder insuline. Enzymen zijn noodzakelijk voor de vertering van voedsel. Hormonen beïnvloeden de stofwisseling, het spijsverteringsproces en het functioneren van de darmen. Zij regelen onder andere hoeveelheid suiker in het bloed.

Als gevolg van de operatie en een tekort aan alvleesklierenzymen kan vetdiarree ontstaan. Een deel van de voeding wordt niet verteerd en niet opgenomen in het bloed. Daardoor ontstaat vettige diarree en sterke vermagering. Als u de alvleesklierenzymen die de arts u voorschrijft inneemt, kan uw voeding vrijwel normaal worden verteerd en opgenomen.

Naar huis

U mag naar huis wanneer:

- u zich goed voelt en in staat bent om naar huis te gaan;
- u ontlasting gehad heeft;
- u uitleg over voeding (eventueel sondevoeding) heeft gehad en alles duidelijk is;
- u goede pijnstilling heeft;

- de wond verzorgbaar is;
- en indien nodig thuiszorg geregeld is.

Als u weer thuis bent merkt u dat u nog snel moe bent en minder eetlust heeft. Dit duurt vaak lang, soms een half jaar. Wanneer u weer helemaal hersteld bent van de operatie is moeilijk aan te geven, dit verschilt van persoon tot persoon.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo zijn ook bij de Whipple operatie de normale risico's op complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Bij een nabloeding kan met spoed een nieuwe operatie nodig zijn. Bij een wondinfectie duurt de genezing langer dan normaal en het kan zijn dat uw ziekenhuisverblijf verlengd wordt.

Een complicatie die relatief vaak optreedt, is de vertraagde maagontleding. Doordat de kop van de alvleesklier met de twaalfvingerige darm is weggehaald komt de maagontleding traag op gang. De porties moeten hiervoor aangepast worden en er kunnen medicijnen voor gegeven worden. In een enkel geval is het noodzakelijk om opnieuw een maagsonde te geven.

Naadlekkage: een vervelende complicatie is als er een lek ontstaat in een verbinding van de geopereerde organen. Hierdoor ontstaat een ontsteking in het operatiegebied. Vaak kan de ontsteking van buitenaf onder röntgenbegeleiding gedraineerd worden. Hierbij wordt een slangetje (drain) in de buik gebracht wat het wondvocht opvangt. Door dit slangetje kan het ontstekingsgebied eventueel gespoeld worden. Soms is er toch een nieuwe operatie onder narcose nodig, waarbij de buikholte schoongemaakt wordt.

Door de minder goed werkende en/of gedeeltelijke verwijdering van de alvleesklier kunt u een bepaalde vorm van suikerziekte (diabetes) krijgen. Het is niet nodig om een streng suikervrij dieet te gaan volgen. Met medicijnen en door de voeding regelmatig over de dag te verdelen kan het bloedsuikergehalte gereguleerd worden. Uw bloedsuikers worden dan ook regelmatig gecontroleerd gedurende de opname en bij afwijkingen wordt overlegd met een diabetesverpleegkundige.

Chyluslekkage: in het menselijk lichaam bevindt zich ook een zeer uitgebreid lymfenetwerk. Lymfe speelt een belangrijke rol bij het immuunsysteem van het lichaam. Het ruimt onder andere virussen, bacteriën en afvalstoffen op die het lichaam zijn binnengedrongen. Tijdens de operatie kan per ongeluk een lymfevat worden aangeprikt. Het lymfevocht komt 'vrij' in het lichaam te zitten en wordt opgevangen in de wonddrain. Dit ziet er uit als melkachtige vloeistof.

Redenen voor contact en/of bezoek polikliniek te vervroegen

- Bij nabloeding, roodheid rondom de wond, zwelling of koorts hoger dan 38.5°C.
- Bij acute benauwdheid.
- Pijn bij de ademhaling.
- Gewichtsverlies, terwijl u niet minder bent gaan eten.
- Afname van uw conditie.
- Heesheid.
- Andere klachten waar u zich zorgen over maakt.

U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met:

- de verpleegkundige GE-consulent Trudy Rapmund via (010) 291 23 62;
- de polikliniek Chirurgie via (010) 291 22 45;
- uw eigen huisarts.

Buiten kantooruren en in het weekend/feestdagen kunt u contact opnemen met uw huisarts of de Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99.

Notities



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

