

PATIËNTEN INFORMATIE

Iloprost (Ilomedine®)

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Hoe werkt iloprost?

Iloprost is een bloedvat verwijdend medicijn en remt het vastplakken van de bloedplaatjes aan de vaatwand. Hierdoor zorgt het voor een betere bloeddorstrooming, bijvoorbeeld bij slecht genezende wondjes. Veel mensen merken direct effect: de aangedane plekken worden warmer en kunnen rood verkleuren. Soms treedt het effect geleidelijk op in de loop van een aantal weken. Bij sommige mensen werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.

Voor welke aandoeningen gebruikt u iloprost?

Uw arts schrijft u iloprost voor als u een ernstig fenomeen van Raynaud hebt of zeer slecht genezende wondjes, vaak aan handen en voeten. Dit komt onder meer voor bij reumatische auto-immuunziekten zoals systemische sclerose en systemische lupus erythematoses (SLE).

Hoe moet u iloprost gebruiken?

Iloprost krijgt u in de vorm van een infuus. Dit infuus kan afhankelijk van de klachten tot 5 dagen achter elkaar gegeven worden. De dosering van iloprost wordt langzaam opgehoogd en bij elke verhoging controleert de verpleegkundige uw bloeddruk en polsslag. De dosering is afhankelijk van hoe u het medicijn verdraagt.

Welke bijwerkingen kunt u krijgen?

De bijwerkingen van iloprost treden meestal op tijdens de toediening van het infuus en zijn over het algemeen daarna verdwenen. Hieronder leest u welke belangrijke bijwerkingen kunnen voorkomen bij iloprost gebruikers:

- *Gevoel van opvliegers*: tijdens het infuus is het mogelijk dat er gevoel van opvliegers met warmtesensatie en blozen optreden. Evenals transpireren, misselijkheid en braken. Geef dit direct door aan de verpleegkundige zodat hij/zij met de arts kan overleggen. Vaak wordt de dosering van iloprost (infuusnelheid) dan aangepast.

- *Bloeddrukdaling*: tijdens het infuus kan een sterke daling van de bloeddruk, een trage polsslag en/of pijn op de borst optreden. Geef dit direct door aan de verpleegkundige zodat hij/zij met de arts kan overleggen. Als het nodig is, staakt de arts het infuus tijdelijk of definitief.
- *Overgevoelighedsreacties*: tijdens het infuus is het mogelijk dat er een overgevoelighedsreactie optreedt. Als u last krijgt van kortademigheid, ernstige duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, hoofdpijn, koude rillingen, zwelling van de lippen, huiduitslag of jeuk, moet u dit onmiddellijk laten weten aan de verpleegkundige, zodat hij/zij meteen de arts kan waarschuwen. Als het nodig is, wordt de toediening van het infuus vertraagd of gestopt of u krijgt een medicijn om deze reactie tegen te gaan.
- *Maag- en darmklachten*: zoals verminderde eetlust, maagzuur en diarree.
- *Allergische reacties*: wanneer u niet goed tegen iloprost kunt, is het mogelijk dat u een allergische reactie krijgt. Denk aan huidafwijkingen, koorts of benauwdheidsklachten. Als dit tijdens het infuus gebeurt, geef dit dan direct aan bij de verpleegkundige. Bent u weer thuis en krijgt u dergelijke klachten, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw huisarts, reumaverpleegkundige en/of behandelaar.

Zijn er controles nodig als u iloprost gebruikt?

Tijdens toediening van het infuus controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk en uw pols. Er zijn geen extra bloedcontroles nodig voor of na het toedienen van iloprost.

Kunt u iloprost gebruiken met andere medicijnen?

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van bloedverdunners door het effect van iloprost op de bloedplaatjes. Iloprost kan de werking van bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva) versterken.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Van iloprost is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt. Er is weinig informatie over de effecten van iloprost tijdens zwangerschap. Iloprost mag u daarom niet tijdens de zwangerschap gebruiken. Het is onbekend of dit geneesmiddel in de moedermelk overgaat. U mag daarom geen borstvoeding geven als u iloprost gebruikt.

Hebt u een kinderwens of bent u (onverwacht) zwanger, vertel dit dan aan uw arts. Uw arts beslist dan samen met u wat u het beste aan uw medicijngebruik kan veranderen als dat nodig is.

Wat moet u nog meer weten?

- *Alcohol*: Door het gebruik van alcohol kunt u meer last van bijwerkingen krijgen. Daarom is het verstandiger geen alcohol te gebruiken op de dagen dat u wordt behandeld met iloprost.
- *Autorijden*: Iloprost kan de bloeddruk verlagen en daardoor klachten als hoofdpijn en duizeligheid geven. Rijd daarom geen auto direct na de behandeling.
- *Als u een aandoening hebt met groot risico op bloedingen*: Iloprost mag u niet gebruiken als u een aandoening hebt met een groot risico op bloedingen. Denk aan een maagzweer of een recente bloeding in het hoofd. Vertel het altijd aan uw arts als u een andere aandoening hebt of hebt gehad.
- *Hartaandoeningen*: Heeft u onlangs een hartinfarct gehad of heeft u last van hartfalen? Dan is behandeling met iloprost af te raden. Vertel het altijd aan uw arts als u een andere aandoening hebt of hebt gehad.

Vragen?

Hebt u dringende vragen neem dan contact op met de polikliniek Reumatologie via (010) 291 22 05. Onze baliemedewerkers zijn iedere werkdag van 08.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar op dit telefoonnummer. Onze reumaverpleegkundigen zijn iedere werkdag van 08.00 uur tot 12.00 uur op hetzelfde telefoonnummer te bereiken.

Heeft de vraag geen spoed? Stel dan uw vraag via het zorgportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis op onze website.

Bron: Reumafonds

Notities



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

