

PATIËNTEN INFORMATIE

Endoscopie onderzoek en bloedverdunners

Binnenkort komt u naar het Maasstad Ziekenhuis voor een onderzoek of behandeling op het Maag-, Darm- en Levercentrum en u gebruikt bloedverdunners. Bij het gebruik van bloedverdunners bestaat er een mogelijkheid dat er een bloeding optreedt.

Deze folder geeft u informatie over hoe het gebruik van deze medicatie geregeld wordt voorafgaand aan het onderzoek of behandeling en daarna.

Medicijnen

Gebruik van ASCAL® (acetylsalicylzuur), carbasalaatcalcium:

Het gebruik hiervan dient u **NIET** te stoppen.

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Gebruik van bloedverdunners waarvan de inname wordt geregeld door de STAR/ trombosedienst als SINTROM MITIS® (acenocoumarol) en MARCOUMAR® (fenprocoumon)

U krijgt een formulier mee dat u aan de STAR/trombosedienst dient af te geven. Zij regelen, in samenspraak met u, de stolling rondom het onderzoek of de behandeling.

Gebruik van overige bloedverdunners als PLAVIX®, GREPID® (clopidrogel), BRILLIQUE® (ticagrelor), EFIENT® (prasugrel), PRADAXA® (dabigatran), ELIQUIS® (apixaban), XARELTO® (rivaroxaban), PERSANTIN® (dipyridamol).

De aanvrager van het onderzoek en/of de behandeling dient u advies te geven of, en zo ja, wanneer u moet stoppen met de bloedverdunner.

Maasstad Ziekenhuis, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**
een santeon ziekenhuis

