

PATIËNTEN INFORMATIE

Colonoscopie met Picoprep® voorbereiding

Onderzoek dikke darm bij kinderen



**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het darmonderzoek colonoscopie dat uw kind moet ondergaan. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

Algemeen

Uw kind wordt op de afdeling Dagbehandeling of de afdeling Kindergeneeskunde opgenomen voor een onderzoek van de dikke darm met een endoscoop. Het onderzoek vindt onder verdoving (narcose) plaats op de operatiekamer, zodat uw kind niets van het onderzoek merkt.

Doel van het onderzoek

Bij een colonoscopie wordt het slijmvlies van de dikke darm bekeken op de aanwezigheid van afwijkingen, zoals ontstekingen, divertikels (darmuitstulpingen), poliepen of gezwellen met behulp van een endoscoop.

Wat is een endoscoop?

Een endoscoop is een dunne flexibele slang met aan het uiteinde een kleine videocamera.

Kunt u niet naar de afspraak komen

Wij verzoeken u om Bureau Opname te bellen als:

- uw kind een dag voor de ingreep verkouden is, erg hoest of koorts heeft;
- er op de ochtend van de ingreep een probleem is met uw kind;
- u niet naar de afspraak kunt komen.

Vorbereiding voor het onderzoek thuis

Het onderzoek kan alleen worden uitgevoerd als de gehele dikke darm voldoende leeg en schoon is. Daarom is het belangrijk dat uw kind zich aan de onderstaande regels houdt.

3 Dagen voor het onderzoek

Geef uw kind geen eten of fruit met pitjes en dergelijke. Dit is om te voorkomen dat de endoscoop verstopt raakt tijdens het onderzoek.

Geef u kind ook geen:

- groenten met vezels zoals asperges, prei, sperziebonen, rauwkost, tomaten;
- volkoren/graan producten zoals volkorenbrood, volkoren pasta en zilvervliesrijst;
- noten, pinda's en zaden;
- fruitsoorten zoals kiwi's, druiven, sinaasappel, grapefruit.

Vorbereiding voor het laxeren

Bij de apotheek kunt u het recept het laxemiddel Picoprep® ophalen.

Let op: de voorbereiding wijkt af van wat op de bijsluiter staat vermeld. Houd de volgende instructies aan en niet die van de apotheek/bijsluiter.

Laxeerschema

2 Dagen voor het onderzoek

Geef u uw kind 's avonds voor het slapen gaan 5 of 10 mg Dulcolax (volgens afspraak).

1 Dag voor het onderzoek

- Uw kind mag een licht ontbijt en lichte lunch
- 17.00 uur: Picoprep®*1 oplossen in een 150 ml koud water, 2-3 minuten roeren en dan uw kind laten opdrinken. De oplossing moet er nu uit zien als een gebroken witte, wolkachtige vloeistof met een vage sinaasappelgeur. Soms wordt de oplossing warm, dan wachten tot het is afgekoeld.
- Hierna moet uw kind helder vloeibaar drinken*2 (bijvoorbeeld water, thee, appelsap, dubbelfris, ice tea, ranja, heldere bouillon).
- Geef uw kind voor het slapen gaan nogmaals 5 of 10 mg Dulcolax (volgens afspraak).

Dag van het onderzoek

- 06.00 uur: nogmaals Picoprep®*1 oplossen in een 150 ml koud water, 2-3 minuten roeren en dan uw kind laten opdrinken. De oplossing moet er nu uit zien als een gebroken witte, wolkachtige vloeistof met een vage sinaasappelgeur. Soms wordt de oplossing warm, dan wachten tot het is afgekoeld.
- Hierna moet uw kind helder vloeibaar drinken*2 (bijvoorbeeld water, thee, appelsap, dubbelfris, ice tea, ranja, heldere bouillon).
- Tot 10.00 uur alleen helder vloeibaar drinken.
- Na 10.00 uur niet meer eten en drinken (nuchter zijn).

***1 - Hoeveelheid Picoprep® bij kinderen**

Leeftijd	Dag voor het onderzoek	Dag van het onderzoek
1-2 jaar	1/4 zakje Picoprep®	1/4 zakje Picoprep®
2-4 jaar	1/2 zakje Picoprep®	1/2 zakje Picoprep®
4-9 jaar	1 zakje Picoprep®	1/2 zakje Picoprep®
9 jaar en ouder	1 zakje Picoprep®	1 zakje Picoprep®

***2 - Regels voor het drinken na inname Picoprep®**

Leeftijd	Helder drinken na ieder zakje Picoprep®
1-2 jaar	totaal 500-750 ml
2-4 jaar	totaal 750-1000 ml
4-9 jaar	totaal 1000-1500 ml
9 jaar en ouder	totaal 1500-2000 ml

Opname op de afdeling Kindergeneeskunde

Als uw kind geen heldere ontlasting heeft (uitziend als water) na het innemen van de het laxeermiddel, dan moet er rectaal via een slangetje met warm water gespoeld worden.

Onder verdoving (narcose)

Bij kinderen wordt eigenlijk altijd volledige verdoving (algehele anesthesie) toegepast. Bij de preoperatieve screening wordt afgesproken of uw kind gaat slapen met een 'kapje' of met een prikje.

Wanneer de behandelend arts samen met u en uw kind heeft besproken dat uw kind in aanmerking komt voor verdoving, wordt er een afspraak gemaakt worden voor de preoperatieve screening. Daar wordt uw kind lichamelijk onderzocht en wordt er uitleg gegeven hoe alles in zijn werk gaat rondom de verdoving.

Ook is het verstandig om een afspraak te maken met een pedagogisch medewerkster van de kinderafdeling voor een voorlichting over de verdoving. De pedagogisch medewerkers zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken via (010) 291 37 09.

Roesje

In overleg kan er soms gekozen worden om niet onder volledige verdoving te gaan. Dan krijgt uw kind op de afdeling waar het onderzoek plaatsvindt een infuusnaaldje in de arm waardoor er medicatie gespoten wordt waar uw kind slaperig van wordt. Vaak herinnert uw kind zich later niets van het onderzoek.

Medicijnen

Zorg dat u een lijst bij zich heeft met de medicijnen die uw kind gebruikt. Eventueel kunt u een lijst opvragen bij uw eigen apotheek.

Ijzertabletten

Een week voor het onderzoek moet uw kind stoppen met het gebruik van ijzertabletten (Fero-Gradumet® of Ferrofumaraat®). Deze middelen geven de darm een zwarte kleur, waardoor de afbeeldingen onduidelijk worden. Na het onderzoek mogen de medicijnen weer ingenomen worden.

Anticonceptiepil

Door het gebruik van laxeremiddelen kan de werking van de anticonceptiepil verminderd zijn. Houdt hier rekening mee als uw kind de anticonceptiepil gebruikt. Laat uw kind zich op een andere manier beschermen.

Risico's en complicaties

Een colonoscopie is over het algemeen een veilig onderzoek. Toch kan er in een enkel geval een complicatie optreden. Gemiddeld treedt er per 1000 onderzoeken tweemaal een serieuze complicatie op. Meestal gaat het dan om een perforatie of een bloeding.

Perforatie

Een perforatie is een scheurtje of gaatje in de darmwand. De kans dat er tijdens het onderzoek een perforatie ontstaat, is groter als:

- de darm ernstig ontstoken is;
- er veel uitstulpingen in de darm zitten;
- er een behandeling wordt uigevoerd, zoals het verwijderen van poliepen.

Klachten die bij een perforatie optreden zijn buikpijn en (later) koorts.

Een perforatie kan goed behandeld worden. Maar uw kind moet dan wel worden opgenomen en misschien geopereerd.

Bloeding

De kans op een bloeding is groter dan normaal als er een behandeling heeft plaatsgevonden, zoals het verwijderen van poliepen of het oprekken van vernauwingen. Een bloeding kan goed worden behandeld.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan uw nog wat buikklachten hebben en wat bloed verliezen, dit gaat vanzelf over.

Neem contact op met het ziekenhuis opnemen als uw kind:

- veel zwarte ontlasting heeft;
- veel bloedverlies heeft;
- aanhoudende buikpijn heeft.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u telefonisch of bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek van de behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, schrijf deze dan op en neem ze mee naar het ziekenhuis. Of stuur een bericht via de [BeterDichtbij app](#).

Belangrijke telefoonnummers:

- Bureau Opname (010) 291 31 71
- Polikliniek Preoperatieve Screening (010) 291 19 79
- Spoedeisende hulp (010) 291 36 10
- Pedagogisch medewerkers (010) 291 37 09
- Afdeling Kindergeneeskunde (010) 291 30 51

Notities



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

