

# PATIËNTEN INFORMATIE

Infectiepreventie bij  
heup- of knieprothese

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



U heeft een operatie gehad waarbij een kunstgewricht (prothese) is geplaatst. Om een infectie te voorkomen van dat kunstgewricht is het belangrijk dat u in onderstaande situaties tijdelijk beschermd wordt met penicilline of een daarmee vergelijkbaar antibioticum.

A. Situaties waarbij u beschermd moet worden.

1. Operaties of inwendige ingrepen
2. Verwondingen
3. Etterende wonden, steenpuisten of bloedvergiftiging
4. Andere ontstekingen

Het is verstandig om in bovenstaande gevallen uw behandelend arts of tandarts aan uw heup- of knieoperatie (prothese) te herinneren.

B. Verder moet u, wanneer u langer dan een aantal dagen koorts heeft, contact opnemen met uw huisarts en deze brief overhandigen.

C. Bij opname in het ziekenhuis moet u steeds vermelden dat bij u een kunstgewricht (prothese) is geplaatst.



## **Deze tekst is bedoeld voor uw behandelend arts**

### **Preventie van infecties bij heup- of knieprothese**

Volgens de Richtlijn Totale Heup of Knie prothese van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (2016) wordt bij het ondergaan van de volgende invasieve ingrepen kortdurende antibiotische profylaxe aanbevolen:

- alle invasieve procedures als de patiënt een verminderde weerstand heeft;
- cystoscopie als de urinekweek positief is bij een symptomatische infectie;
- endoscopie(sche ingreep) in geïnfecteerd gebied;
- oesofagoscopische ingrepen.

Het is niet geïndiceerd om antibiotische profylaxe te geven aan patiënten met een gewrichtsprothese vóór een mond- of tandheelkundige ingreep ter preventie van een hematogene infectie van de gewrichtsprothese. Evenmin geldt dat in geval van verminderde immuniteit van de patiënt. Het is aanbevelingswaardig om bij de patiënt het belang van een goede mondgezondheid te benadrukken en regelmatige tandheelkundige controles aan te raden.

De keuze van het middel zou kunnen zijn een eenmalige gift van amoxicilline en clavulaanzuur (Augmentin®, 2 tabletten van 500/125 mg per os 1 uur vóór de ingreep).

Bij beta-lactam allergie zou dan clindamycine gegeven kunnen worden (600 mg p.o. 1 uur vóór de ingreep).

Patiënten met infectie, zoals bijvoorbeeld huidinfectie, otitis of orgaan-infectie (pneumonie, pyelonephritis, cholecystitis e.d.) dienen vroegtijdig en met extra zorg met antibiotica behandeld te worden. De keuze van antibiotica en de duur van hun toepassing wordt bepaald door de aard van de vermoedelijke verwekker.

### **Vragen?**

Voor eventuele vragen kunt u de polikliniek Orthopedie bellen via (010) 291 22 75.





De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص مآ الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasenik.nl](http://www.maasenik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

