



## PATIËNTENINFORMATIE HSG (HYSTERO-SALPINGOGRAFIE)

### Algemeen

Door middel van deze brief wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het onderzoek. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig door te lezen.

### Wat is een HSG?

Een HSG is een onderzoek van de baarmoeder en de eileiders. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een zo laag mogelijke dosis röntgenstralen.

### Doel van het onderzoek

Het onderzoek is bedoeld om na te gaan of er afwijkingen aan de baarmoederholte zijn en om te zien of de eileiders doorgankelijk zijn.

### Zwangerschap

Indien de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, neemt u dan contact op met de arts die u heeft verwezen, voor nader overleg.

### Allergie

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een contrastmiddel. Sommige mensen zijn hiervoor overgevoelig en kunnen de volgende reacties krijgen: galbulten, rode vlekken op de huid en benauwdheid.

Indien u bij eerder onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel een (ernstige) allergische reactie heeft gekregen, verzoeken wij u dit van tevoren aan ons en uw behandelend arts te melden, zodat eventuele voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen of gekozen kan worden voor een alternatief onderzoek.

### Vorbereiding

- Wij adviseren u geen waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis.
- Eén uur voor het onderzoek moet u 2 tabletten Naproxen (pijnstiller) innemen. U krijgt deze van de assistente op de polikliniek.
- Wij adviseren u maandverband mee te nemen.

### Het onderzoek

De gynaecoloog brengt een spreider (eendenbek) in en de schede en de baarmoeder worden ontsmet. Er wordt een katheter (dun slangetje) in de baarmoeder geplaatst. Via dit slangetje wordt een contrastvloeistof in de baarmoeder en de eileiders gespoten. Soms is dit pijnlijk. De pijn trekt meestal snel weer weg. Er worden direct foto's gemaakt. De katheter wordt weer verwijderd. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

### Na het onderzoek

Het is mogelijk dat u enig bloedverlies via de vagina heeft. Het is verstandig om na het onderzoek maandverband te gebruiken. Ook kunt u wat pijn in de buik hebben. Het is daarom prettig als u iemand meeneemt om u te begeleiden.

Indien u na het onderzoek koorts (meer dan 38 graden) krijgt moet u contact opnemen met de poli gynaecologie, telefoon 010-291 2280  
De uitslag krijgt u van de behandelend arts.

**Tot slot**

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of de radiodiagnostisch laborant(e). Telefonisch kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie via 010-291 2200.