



PATIËNTENINFORMATIE WORTELBLOKKADE

Algemeen

Door middel van deze brief wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over een wortelblokkade.

Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Wat is een wortelblokkade?

Een wortelblokkade is een tijdelijke uitschakeling van een zenuw in de rug door middel van een injectie met een verdovingsvloeistof. Door deze verdoving kan de zenuw geen pijnprikkel meer doorgeven aan de hersenen.

Het niveau waar de wortelblokkade plaatsvindt, wordt bepaald met behulp van röntgenstraling.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met een zo laag mogelijke dosis röntgenstraling.

Doel van het onderzoek

Door middel van dit onderzoek kan bepaald worden of de zenuw inderdaad de veroorzaker van uw klachten is.

Zwangerschap

Indien de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, neemt u dan contact op met de arts die u heeft verwezen voor nader overleg.

Allergie

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een contrastmiddel. Sommige mensen zijn hiervoor overgevoelig en kunnen de volgende reacties krijgen: galbulten, rode vlekken op de huid en benauwdheid.

Indien u bij eerder onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel een (ernstige) allergische reactie heeft gekregen, verzoeken wij u dit van tevoren aan ons en uw behandelend arts te melden, zodat eventuele voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen of gekozen kan worden voor een alternatief onderzoek.

Vorbereiding

- Voor het onderzoek is een dagopname noodzakelijk. Deze opname is op de polikliniek met u geregeld.
- Op de dag van het onderzoek kunt u normaal eten en drinken.
- Indien u **bloedverdunners** gebruikt, is het van belang dat u dit gebruik in overleg met uw arts aanpast om de kans op een nabloeding zoveel mogelijk te beperken. Indien u uitsluitend **Ascal** (acetylsalicylzuur) als bloedverdunner gebruikt, hoeft de dosering niet aangepast te worden.
- Eventuele overige medicijnen die u gebruikt, kunt u op de gebruikelijke manier innemen.

Het onderzoek

U ligt, afhankelijk van de plaats waar de wortelblokkade gedaan wordt, op uw rug of buik op de onderzoek tafel.

De huid wordt ontsmet en onder röntgendoorlichting wordt een speciale naald ingebracht, waarbij de punt van de naald de zenuw bereikt. Vervolgens wordt een verdovingsmiddel en een ontstekingsremmend middel ingespoten bij de zenuwwortel.

Na inspuiting wordt de naald verwijderd en op de plaats waar geprikt is, wordt een pleister geplakt. Deze pleister kunt u de volgende dag verwijderen.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

- Na het onderzoek gaat u terug naar de verpleegafdeling.
- U krijgt verdere instructies van de verpleegkundige.
- Door de verdoving kan er tijdelijk minder gevoel en/of krachtverlies in uw been optreden. Dit duurt meestal enkele uren, waardoor u minder goed kan lopen, fietsen of autorijden. Het is daarom belangrijk dat u met begeleiding naar huis gaat.
- Het pijnstillend effect kan enkele uren tot dagen aanhouden.
- Het is belangrijk om bij te houden of de pijn is verminderd en hoe lang deze pijnvermindering heeft geduurd.
- Het resultaat van het onderzoek wordt op de eerstvolgende afspraak met u besproken door uw behandelend arts.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de arts die u heeft verwezen of de röntgenlaborant(e).

Telefonisch kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie via 010-2912200.