

# PATIËNTEN INFORMATIE

## Orchidopexie bij kinderen

Het plaatsen van de zaadbal in het scrotum



**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de afwijking en behandeling van een niet in het scrotum ingedaalde testis. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. Het is goed te realiseren dat de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.

### **Niet ingedaalde testis**

Tijdens de zwangerschap ontstaat al in een vroeg stadium in het liesgebied van de foetus een uitstulping van het buikvlies via de buikwand (het lieskanaal). Bij jongetjes dalen hierlangs later de zaadbal en de zaadstreng in naar het scrotum. Van alle geboren jongens hebben er vier à zeven per duizend één of twee niet ingedaalde zaadballen. De zaadbal (testikel) bevindt zich niet in de balzak maar in de lies. Hierdoor wordt de normale ontwikkeling van de zaadbal bedreigd en daarmee de productie van zaadcellen en mannelijke geslachtshormonen. Bovendien geeft het een verhoogde kans op teelbalkanker.

De indaling van de zaadballen kan op verschillende niveaus stagneren. De (eventuele) behandeling is afhankelijk van de mate waarin de zaadbal is ingedaald.

### **Onderzoek en behandeling**

Wanneer de bal in de lies gevoeld wordt, kan de arts proberen (met behulp van een strijkende handbeweging naar beneden) deze in de balzak te brengen.

Als dit niet mogelijk is, spreken we van een niet ingedaalde testis. Dan moet een operatie plaatsvinden zodat de bal op zijn plaats komt. Soms is de bal niet te voelen en ook niet met geluidsgolven (echografie) in de lies aan te tonen. Meestal vindt dan een kijkoperatie (laparoscopie) plaats om vast te stellen of de bal misschien nog in buik zit. Afhankelijk van hoe de bal eruit ziet, wordt besloten wat er moet gebeuren.

### *Wanneer opereren?*

Het moment van de operatie is afhankelijk van het tijdstip waarop de afwijking wordt ontdekt. Is dit voor het einde van het tweede levensjaar, dan wordt aangeraden de operatie aan het einde van het tweede levensjaar te verrichten. Als de diagnose later wordt gesteld kan het tijdstip worden aangepast aan de persoonlijke omstandigheden.

### **Vorbereiding**

Omdat de operatie plaatsvindt onder narcose mag uw zoon vanaf 24.00 uur niet meer drinken en eten.

### **De operatie**

De operatie gebeurt onder algehele anesthesie (narcose) in dagbehandeling of tijdens een kortdurende opname. Via een sneetje in de lies wordt de zaadbal met zaadleider opgezocht en vrijgemaakt. Via een sneetje onder in de balzak wordt de zaadbal naar beneden gehaald. De operatie duurt ongeveer 45 minuten.

### **Na de operatie**

Na de operatie mag uw kind drinken. Als uw kind niet misselijk is, kan hij thuis weer normaal eten.

### **Mogelijke complicaties**

Geen enkele operatie is vrij van kans van complicaties. Er zijn vroege en late complicaties. Vroege complicaties zijn problemen met de wondgenezing en bloedingstoringen in het operatiegebied. De late complicaties kunnen een onbevredigend cosmetisch resultaat, een uitblijven van de normale ontwikkeling van de zaadbal en beschadiging van de structuur in de zaadstreng zijn.

### **Nabehandeling**

U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek voor ongeveer vier weken na de operatie.

### **Adviezen voor thuis**

Na de operatie hoeft uw kind geen bedrust te houden. Ongeveer een week na de operatie kan uw kind weer naar school. Wacht u met fietsen, zwemmen, sporten of meedoen met gymnastiek tot de nacontrole bij de specialist.

Het is normaal dat kinderen de eerste tijd na een operatie een lichte verhoging tot ongeveer 38,5°C hebben. Deze verhoging neemt in de loop van enkele dagen af tot normaal.

Indien uw kind pijn heeft, mag u hem een paracetamol geven. Deze pijnstilling is bij de

apotheek als zetpil of als tablet te verkrijgen. De dosering is afhankelijk van de leeftijd en het gewicht van uw kind.

Houd de wond droog en schoon. Als uw kind luiers draagt kunt u deze het best wat vaker verwisselen. Het is mogelijk dat het operatiegebied de eerste dagen wat opgezet is. In de regel verdwijnt dit na ongeveer zeven dagen vanzelf en is behandeling niet nodig.

### **Website**

Om kinderen goed voor te bereiden op een bezoek aan de polikliniek, een onderzoek of operatie, is het goed om met uw kind samen informatie door te nemen.

Hierdoor wordt het bezoek, onderzoek of de operatie vaak beter ervaren door het kind en verloopt het aangenamer.

Op onze kinderwebsite [www.maasnik.nl](http://www.maasnik.nl) wordt op leeftijds categorie door middel van foto's en filmpjes uitgelegd hoe het in het Maasstad Ziekenhuis gaat.

### **Vragen**

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan de behandelend arts of huisarts. Bij dringende vragen of problemen vóór de behandeling kunt u zich het beste wenden tot de polikliniek Urologie via (010) 291 22 65. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21

3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

E: [info@maasstadziekenhuis.nl](mailto:info@maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasenik.nl](http://www.maasenik.nl) (kinderwebsite)

