

# PATIËNTEN INFORMATIE

## Bovenooglid- correctie

Polikliniek

Oogheelkunde

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over bovenooglidcorrecties. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Het komt regelmatig voor dat mensen, bij het zien, last krijgen van 'zware' bovenoogleden. Dit kan zich uiten door belemmering bij het zien (zogenaamde blikveldbeperking), een moe en zwaar gevoel in de ogen en problemen bij televisie kijken of de krant lezen. Meestal worden de klachten in de loop van de dag erger. Vaak is er ook de klacht dat men er zo 'oud' of 'zo moe' uitziet.

### **Verwachtingen en mogelijkheden**

Het gaan hangen van de bovenoogleden is het gevolg van het slapper worden van de huid en de spier rond het oog. Soms gaat dit samen met een uitpuilen van vetweefsel in de oogkas, waardoor de huid naar voren wordt geduwd, gaat plooiën of een bolling boven of onder het oog laat zien. Het is mogelijk dit operatief te behandelen.

### **Voor de operatie**

Voor de operatie wordt gevraagd of u verder gezond bent, ernstige operaties heeft ondergaan en welke geneesmiddelen u gebruikt. Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet het gebruik hiervan zeker een week voor de operatie gestaakt worden in overleg met de voorschrijvende arts.



## **De operatie**

Vlak voor de operatie tekent de oogarts het huiddeel af dat weggenomen wordt. De ingreep vindt plaats onder lokale verdoving (dit zijn enkele kleine verdovingsprikken). De operatie bestaat uit het wegnemen van het huid- en spieroverschot, al dan niet gecombineerd met het verwijderen of verplaatsen van het overtollige vetweefsel. Het grootste deel van het litteken komt te liggen in de natuurlijke plooi van het bovenooglid. Deze littekens trekken bij en zijn vrijwel altijd onopvallend.

## **Na de operatie**

Na de operatie kunnen de oogleden dik, blauw en gezwollen zijn, maar vrijwel nooit zo dat men niet meer kan zien. Er wordt geen verband aangebracht en wassen en douchen blijft mogelijk. Aangeraden wordt om de huid zeer voorzichtig droog te deppen na het douchen. Het verdient aanbeveling om thuis de eerste dagen de oogleden te koelen met iets kouds uit de koelkast. De pijn en zwelling worden daarmee tegengegaan en een pijnstiller is meestal niet eens nodig. Na zeven dagen worden de hechtingen en eventuele pleisters verwijderd. Over het algemeen is het een ingreep die weinig belastend is en een goed resultaat oplevert.

## **Complicaties en risico's**

Soms komt een meer dan normale bloedlekkage achteraf voor. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt dan wel langer voordat het normale uiterlijk is hersteld. Ook kan het voorkomen dat de ogen de

eerste tijd na de operatie niet geheel te openen of te sluiten zijn. Soms kan een zogenaamde epitheelcyste ontstaan in het litteken. Ook dit kan weer chirurgisch worden weggenomen. Dit komt echter zelden voor.

Wanneer u na een operatie aan uw ooglid ernstige pijn krijgt in of rondom uw oog, neem dan direct contact op met de polikliniek Oogheelkunde via (010) 291 22 40 of de Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99. Doe dit ook wanneer u ineens slechter gaat zien in de eerste uren na de operatie.

### **De kosten**

De kosten van een bovenooglidcorrectie wordt in bepaalde gevallen vergoed door de zorgverzekeraar en wordt voor u aangevraagd door de oogarts. De toekenning van de vergoeding wordt beslist door uw zorgverzekeraar. Bent u het niet eens met de beslissing dan neemt hiervoor zelf contact op met uw zorgverzekeraar.

### **Vragen**

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend oogarts of contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde via (010) 291 22 40.





De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21

3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

E: [info@maasstadziekenhuis.nl](mailto:info@maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasenik.nl](http://www.maasenik.nl) (kinderwebsite)

