

PATIËNTEN INFORMATIE

Goudinjecties (Tauredon®-injecties)

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis





Uw behandelaar heeft u goudinjecties voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen.

Het effect van goudinjecties

Met medicijnen is de oorzaak van reumatische aandoeningen niet weg te nemen. Wel zijn er medicijnen die deze aandoeningen rustiger kunnen maken, deze worden reumaremmers genoemd. Na enige tijd kunnen hierdoor klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten afnemen. Een goudinjectie is zo'n medicijn. Het kan twee tot vier maanden duren voordat u merkt dat de injecties beginnen te werken. Als u al pijnstillers gebruikt kunt u deze blijven gebruiken. Indien de goudinjecties een gunstig effect hebben, kunt u ze jarenlang blijven gebruiken. Helaas hebben ze niet bij iedereen een gunstig effect. Als het bij u niet werkt of als u teveel last hebt van bijwerkingen, kan u in overleg met de behandelaar besluiten het gebruik van goudinjecties stop te zetten.

Samenstelling

Goudinjecties bevatten een oplossing van aurothromalaat.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen

Over het algemeen kunt u goudinjecties in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Als u goudinjecties gebruikt samen met bloedverdunders van de trombosedienst, zoals Sintrom(mitis)[®] of Marcoumar[®], heeft u op de plaats van de injectie meer kans op een blauwe plek.

Vertel uw huisarts, uw specialist en de trombosedienst altijd welke geneesmiddelen u gebruikt.

De griepvaccinatie (griep prik) en alle andere vaccinaties zijn mogelijk.

Wijze van toediening

De goudinjecties worden u door de doktersassistente op de polikliniek toegediend in de spieren van uw bil of bovenbeen.

Aurothiomalaat veroorzaakt in enkele (uitzonderlijke) gevallen een allergische reactie. Daarom zal uw behandelaar éénmalig een (lage) proefdosis toedienen.

In het begin krijgt u één goudinjectie per week. Vaak is na verloop van tijd één injectie per maand voldoende.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiters van de apothekers staan alle bijwerkingen vermeld die ooit zijn voorgekomen. De meest voorkomende bijwerkingen van goudinjecties zijn:

- Jeuk en huiduitslag, deze kan verergeren door zonlicht.
- Ontstekingen in het slijmvlies van de mond, zoals pijnlijke plekjes.
- Erge keelpijn in combinatie met koorts, herhaaldelijk een bloedneus en snel blauwe plekken krijgen (allemaal tekenen van een stoornis in de bloedaanmaak).
- Eiwit in de urine. Soms merkt u dat uw urine gaat schuimen, echter vaak merkt u hier niets van. Wel kan dit worden aangetoond bij urineonderzoek.

Neem contact met uw behandelaar of huisarts bij:

- Ontstekingen van het mondslijmvlies.
- Erge keelpijn in combinatie met koorts.
- Herhaaldelijk een bloedneus.
- Snel blauwe plekken krijgen.

Bijwerkingen zijn ook vaak een reden voor het aanpassen van de dosis en de frequentie van de goudinjecties. Stoppen is meestal niet nodig. Als u veel last heeft van bijwerkingen, kunt u stoppen met het gebruik van de goudinjecties.

Controles

Om bijwerkingen in een vroeg stadium te ontdekken, laat uw behandelaar regelmatig uw bloed en urine onderzoeken. Dit gebeurt meestal één keer per drie injecties, maar in het begin soms vaker. Na een jaar kunnen de controles minder frequent worden uitgevoerd. De uitslag van de onderzoeken is na enkele dagen bij uw behandelaar bekend. U hoeft niet te bellen of langs te komen voor de uitslag. Er wordt contact met u opgenomen als de uitslag van de onderzoeken afwijkend is.

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend, hebben goudinjecties waarschijnlijk geen ongunstige invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Het is erg belangrijk om uw behandelaar te informeren als u een zwangerschap overweegt of al zwanger bent. Afhankelijk van uw ziektebeeld beslist uw behandelaar of u het middel kunt doorgebruiken of moet stoppen. Mannen met een kinderwens kunnen de injecties blijven gebruiken. U kunt beter geen goudinjecties gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn wordt namelijk in de moedermelk uitgescheiden. Overleg de situatie met uw behandelaar.

Aanvullende informatie

- Het gebruik van alcohol in de periode dat u goudinjecties gebruikt heeft geen ongunstige invloed op de werking van het medicijn.
- Bewaar geneesmiddelen altijd zó, dat kinderen er niet bij kunnen.

Vragen

Als u nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met de reumaverpleegkundige.

Hiervoor kunt u bellen naar de polikliniek Reumatologie via (010) 291 22 05.

Notities





De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21

3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

