

PATIËNTEN INFORMATIE

Ilomedine (Iloprost)

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**
een santeon ziekenhuis



Uw behandelaar heeft u een behandeling met Iloprost voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te laten werken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen.

Het effect van Iloprost

Met medicijnen is de oorzaak van reumatische aandoeningen niet weg te nemen. Indien er bij de reumatische aandoening sprake is van ernstige vaatvernauwing en/of ontsteking van bloedvaten kan een behandeling met Iloprost noodzakelijk zijn. Iloprost zorgt voor een betere doorbloeding in met name de handen en de voeten. Iloprost is een vaatverwijdend middel dat via een infuus met een spuitpomp wordt toegediend. Veel mensen merken direct effect: de aangedane plekken worden warmer en kunnen rood verkleuren. Soms treedt het effect geleidelijk op in de loop van een aantal weken. Bij sommige mensen werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van bloedverdunners door het effect van Iloprost op de bloedplaatjes. Iloprost kan de werking van bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva) versterken.

Wijze van toedienen

Iloprost wordt altijd via een infuus toegediend in het ziekenhuis. Hiervoor wordt u opgenomen.

Het medicijn wordt via een infuus toegediend. De dosering van iloprost wordt langzaam opgehoogd en bij elke verhoging controleert de verpleegkundige je bloeddruk en polsslag. De dosering is afhankelijk van hoe je het medicijn verdraagt. De behandeling wordt in eerste instantie gedurende vijf dagen gegeven. De eerste dag dient u tijdens de toediening zoveel mogelijk bedrust te houden. De daarop volgende keren kunt u mobiliseren afhankelijk van de klachten en controles.

In een later stadium van de behandeling kan Iloprost ook slechts één dag gegeven worden, op de afdeling Dagbehandeling. De tijdsduur tussen de behandelingen is dan afhankelijk van de klachten. Geef altijd aan indien u klachten krijgt van hoofdpijn, transpireren, duizeligheid of hartkloppingen.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van de Iloprost vermeld die ooit zijn voorgekomen.

De bijwerkingen van iloprost treden meestal op tijdens de toediening van het infuus. Geef dit direct door aan de verpleegkundige zodat hij/zij met de arts kan overleggen. Vaak wordt de dosering van iloprost (infuussnelheid) dan aangepast en zijn de bijwerkingen over het algemeen daarna verdwenen. De meest voorkomende zijn:

- Gevoel van opvliegers: tijdens het infuus is het mogelijk dat er gevoel van opvliegers met warmtesensatie en blozen optreden. Evenals transpireren, misselijkheid en braken.

- Maag- en darmklachten zoals verminderde eetlust, maagzuur en diarree.
- Bloeddruk daling: tijdens het infuus kan een sterke daling van de bloeddruk, een trage polsslag en/of pijn op de borst optreden. Als het nodig is, staakt de arts het infuus tijdelijk of definitief.
- Overgevoelighedsreacties: tijdens het infuus is het mogelijk dat er een overgevoelighedsreactie optreedt zoals kortademigheid, ernstige duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, hoofdpijn, koude rillingen, zwelling van de lippen, huiduitslag of jeuk. Als het nodig is, wordt de toediening van het infuus vertraagd of gestopt of krijg je een medicijn om deze reactie tegen te gaan.
- Allergische reacties: wanneer je niet goed tegen iloprost kunt, is het mogelijk dat je een allergische reactie krijgt. Denk aan huidafwijkingen, koorts of benauwdheidsklachten. Ben je weer thuis en krijg je dergelijke klachten, neem dan zo snel mogelijk contact op met je huisarts, reumaverpleegkundige en/of behandelaar.

Afhankelijk van de klachten wordt de maximaal te verdragen dosis bepaald. Toediening wordt altijd gestart in de laagst mogelijke dosering en indien mogelijk kan dit worden opgevoerd. Het toedienen van extra vocht kan hoofdpijnklachten verminderen.

Direct na of tijdens toediening van Iloprost dient u voorzichtig te zijn met overeind komen uit liggende of zittende positie in verband met bloeddrukdaling die door het middel kan optreden.

Controles

Om eventuele bloeddrukdalingen of hartritmestoornissen te ontdekken, controleert de verpleegkundige tijdens de toediening regelmatig uw bloeddruk en pols.

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Voor zover tot op heden bekend is, heeft Iloprost waarschijnlijk geen ongunstige invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Het is erg belangrijk om uw behandelaar te informeren als u een zwangerschap overweegt of al zwanger bent. Omdat Iloprost niet veilig is voor het ongeborn kind, kunt u deze medicijnen beter niet gebruiken tijdens een zwangerschap. Ook als u borstvoeding geeft mag u geen Iloprost toegediend krijgen. Overleg de situatie met uw behandelaar.

Vragen

Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de reumaverpleegkundige. Hiervoor kunt u bellen met polikliniek Reumatologie via (010) 291 22 05.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11
E: info@maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

