

PATIËNTEN INFORMATIE

Infliximab

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



In deze folder vindt u informatie over de behandeling met het middel infliximab. Het doel van een behandeling met infliximab is het ontstekingsproces tot rust te brengen.

Werking van infliximab

Infliximab is een antilichaam tegen het eiwit TNF. TNF speelt een belangrijke rol bij het op gang brengen en onderhouden van ontstekingen. Bij een aantal reumatische aandoeningen is er sprake van een teveel aan TNF. Infliximab blokkeert TNF waardoor ontstekingsklachten afnemen. Infliximab kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afnemen en uw gewrichten op de lange termijn minder schade oplopen.

Wanneer wordt infliximab voorgeschreven?

Infliximab kan voorgeschreven worden aan patiënten met een reumatische aandoening (zoals reumatoïde artritis, artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew) bij wie andere geneesmiddelen onvoldoende zijn aangeslagen.

Voorafgaand aan de behandeling met infliximab dient onderzocht te worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit houdt in dat u gescreend wordt op een doorgemaakte TBC en hepatitis infectie in het verleden.

Het gebruik van infliximab

De behandeling met infliximab vindt plaats in het ziekenhuis. Infliximab wordt toegediend via een infuus. Dit duurt ongeveer twee uur. Na het eerste infuus volgt er één na twee weken, dan na zes weken en vervolgens elke acht weken. De dosering infliximab is afhankelijk van uw lichaamsgewicht en van de mate van ontstekingen. Infliximab kan snel werken, soms al na 48 uur. Vaak zijn enkele weken nodig om voldoende resultaat te bereiken. Wanneer blijkt dat u goed op het middel reageert, wordt de dosering soms verlaagd. De behandeling met infliximab wordt meestal gecombineerd met methotrexaat (MTX, zie de betreffende informatiefolder).

Controle

Regelmatig wordt er bloed afgenomen voor controle, dit moet in het Maasstad Ziekenhuis worden afgenomen, bijvoorbeeld voorafgaand aan een bezoek aan dagbehandeling. Bij deze controle worden de rode en witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie beoordeeld. Als de uitslagen niet in orde zijn, krijgt u daarover bericht. Indien u niets hoort, is uw bloed in orde. U kunt de uitslagen van het bloedonderzoek opvragen bij uw arts als u de polikliniek bezoekt. Bloedafname en een polikliniek bezoek dienen minimaal halfjaarlijks plaats te vinden.

Bijwerkingen van infliximab

- Tijdens het toedienen van infliximab kunnen schommelingen in de bloeddruk voorkomen. De verpleegkundige controleert daarom regelmatig uw bloeddruk. Ook kunnen lichtheid in het hoofd en een warm gevoel optreden. Deze klachten nemen meestal snel af na het infuus.
- Bij het gebruik van infliximab kan een allergische reactie (huiduitslag) optreden. Meestal gebeurt dat na meerdere behandelingen. De huiduitslag kan tijdens de behandeling optreden, maar ook als u weer thuis bent. U dient deze reactie altijd te melden aan uw reumatoloog. Soms kunnen de allergische reacties behandeld worden met anti-allergiemiddelen. Soms zijn ze een reden om met de behandeling te stoppen.
- Patiënten die infliximab gebruiken, hebben een grotere kans op infecties. Neem daarom altijd de temperatuur op wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, bijvoorbeeld een pussend wondje, altijd contact op met uw reumatoloog.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik van infliximab tijdens zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend om de veiligheid te kunnen beoordelen. Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog. Mocht u tijdens uw zwangerschap zijn behandeld met infliximab dan mag uw zuigeling niet eerder een levend vaccin toegediend krijgen dan ten minste 6 maanden na de geboorte.

Vaccinaties

De jaarlijkse griepvaccinatie wordt bij het gebruik van infliximab geadviseerd. We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen. Vanwege onvoldoende gegevens wordt geadviseerd levende verzwakte vaccins niet tijdens de behandeling met infliximab te geven.

Operaties en andere ingrepen

Op theoretische gronden bestaat er bij het gebruik van infliximab een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing. Daarom wordt over het algemeen geadviseerd om niet eerder dan twee weken na de laatste infliximab toediening een (geplande) operatie (of andere ingreep) te ondergaan. Met de volgende infliximab toediening dient gewacht te worden totdat de wond genezen is.

Gebruik van medicatie tijdens behandeling met infliximab

Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie. Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze folder vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan uw reumatoloog of reumaconsulent. Iedereen die start met een biological krijgt een afspraak bij de reumaconsulent.

Heeft u dringende vragen neem dan contact op met de polikliniek Reumatologie via (010) 291 22 05.

Heeft de vraag geen spoed dan kunt u uw vraag ook stellen via het zorgportaal 'Mijn Maasstad Ziekenhuis' via onze website (www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaasstadziekenhuis).

Notities



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21

3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

