

PATIËNTEN INFORMATIE

Certolizumab pegol (Cimzia®)

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



In deze folder vindt u informatie over behandeling met het middel certolizumab pegol. Het doel van de behandeling met certolizumab pegol is het ontstekingsproces tot rust te brengen.

Werking van certolizumab pegol

Certolizumab pegol is een zogenaamde 'biological', een geneesmiddel dat ontwikkeld is dankzij moderne technologie. Certolizumab pegol is een antilichaam gericht tegen het eiwit TNF-alfa. Dit eiwit speelt een belangrijke rol bij het op gang brengen en onderhouden van ontstekingen. Bij een aantal reumatische aandoeningen is er sprake van een teveel aan TNF-alfa. Certolizumab pegol remt de werking van TNF-alfa waardoor ontstekingsklachten afnemen. Hierdoor kan certolizumab pegol ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afnemen en uw gewrichten op lange termijn minder schade oplopen.

Wanneer wordt certolizumab pegol voorgeschreven?

Certolizumab pegol kan voorgeschreven worden aan patiënten met reumatoïde artritis bij wie andere geneesmiddelen onvoldoende effect hadden. Voorafgaand aan de behandeling met certolizumab pegol dient onderzocht te worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit houdt in dat u gescreend wordt op een doorgemaakte TBC en hepatitis infectie in het verleden.

Het gebruik van certolizumab pegol

Het gebruik van certolizumab pegol gebeurt door middel van onderhuidse injecties. Het toedienen van de injecties kunt u, nadat een verpleegkundige het u geleerd heeft, zelfstandig uitvoeren. Het injecteren moet 1 keer per 2 weken gebeuren. De eerste 3 keer dient u een oplaaddosis van 400 mg (2 injecties) toe. Daarna volstaat de toediening van 1 injectie (200 mg) per 2 weken.

Certolizumab pegol werkt snel, soms al na 2 weken. Het duurt echter langer voordat het effect maximaal is. Certolizumab pegol wordt vaak gecombineerd met methotrexaat (MTX, zie de betreffende informatiefolder).

Controle

Tijdens de behandeling met certolizumab pegol wordt er regelmatig bloed afgenomen voor controle. Bij deze controle worden rode en witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie beoordeeld.

Als de uitslagen niet in orde zijn, krijgt u daarover bericht. Indien u niets hoort, is uw bloed in orde en kunt u doorgaan met de certolizumab pegol injecties.

U kunt de uitslagen van het bloedonderzoek opvragen bij uw arts als u de polikliniek bezoekt.

Bijwerkingen van certolizumab pegol

De volgende opsomming is niet volledig maar geeft een overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen.

- Op de plaats waar u zichzelf injecteert, kan een lichte roodheid of een kleine blauwe plek ontstaan. Wij adviseren u om de injectieplaats af te wisselen. Als u zich afvraagt of u de juiste injectietechniek toepast, neem dan contact op met uw arts of de verpleegkundig reumaconsulente.
- Patiënten die certolizumab pegol gebruiken, hebben een grotere kans op infecties. Neem daarom altijd de temperatuur op wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, bijvoorbeeld een pussend wondje, altijd contact op met uw reumatoloog en wacht met het toedienen van de injectie!

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik van certolizumab pegol tijdens zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend om de veiligheid te kunnen beoordelen. Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties

De griepvaccinatie (griep prik) wordt geadviseerd en mag worden toegediend.

We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

Operaties en andere ingrepen

Op theoretische gronden bestaat er bij het gebruik van certolizumab pegol een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing. Daarom wordt over het algemeen geadviseerd tijdelijk te stoppen met certolizumab pegol als u geopereerd moet worden. Het algemeen advies is om twee weken voor een geplande operatie (of andere ingreep) te stoppen met het gebruik van certolizumab pegol en weer te starten als de wond genezen is.

Gebruik van certolizumab pegol samen met andere medicijnen

Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig.

Aandachtspunt met betrekking tot bloedstollingstesten

Certolizumab pegol kan het resultaat van bepaalde bloedstollingstesten beïnvloeden, hierdoor is het testresultaat onbetrouwbaar. Licht daarom uw arts in over uw behandeling met certolizumab pegol als u een bloedstollingsonderzoek moet ondergaan. Er zijn geen aanwijzingen dat behandeling met certolizumab pegol effect heeft op de bloedstolling.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze folder vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan uw reumatoloog of reumaconsulent. Iedereen die start met een biological krijgt een afspraak bij de reumaconsulent.

Heeft u dringende vragen neem dan contact op met de polikliniek Reumatologie via (010) 291 22 05.

Heeft de vraag geen spoed dan kunt u uw vraag ook stellen via het zorgportaal 'Mijn Maasstad Ziekenhuis' via onze website.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21

3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

