

PATIËNTEN INFORMATIE

Sedatie met propofol bij onderzoek of behandeling

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**
een santeon ziekenhuis



Binnenkort komt u in het Maastricht Ziekenhuis voor een onderzoek of behandeling. Uw arts heeft met u besproken dat u tijdens dit onderzoek sedatie krijgt met Propofol. U wordt dan in slaap gebracht.

Voorafgaand aan het onderzoek gaat u naar de polikliniek Preoperatieve Screening van de afdeling Anesthesiologie. Bij de afdeling Preoperatieve Screening heeft u een afspraak met een doktersassistente en de sedatie praktijk specialist. Deze sedatie praktijk specialist kan een andere sedatie praktijk specialist zijn dan van wie u sedatie krijgt.

De doktersassistente neemt samen met u de ingevulde vragenlijst door, meet lengte, gewicht, bloeddruk en hartfrequentie en geeft informatie over de opname.

De sedatie praktijk specialist stelt zich op de hoogte van uw medische conditie en uw medicijngebruik. Aan de hand van de gegevens bepaalt hij/zij welke medicatie u moet doorgebruiken of juist moet staken voor de behandeling en of er nog aanvullende onderzoeken zoals bloedonderzoek of ECG gedaan moeten worden.

Waarom sedatie

De sedatie zorgt er voor dat u een onplezierig en/of pijnlijk onderzoek beter kunt verdragen. Doordat u slaapt tijdens het gehele onderzoek of behandeling ervaart u geen stress, pijn of angst.

Wat is sedatie

Sedatie is de medische benaming voor het verlagen van het bewustzijn. Propofol is de medicatie die hiervoor gebruikt wordt. De sedatie praktijk specialist van de afdeling Anesthesiologie dient de medicatie toe via een toegang tot de bloedbaan. Propofol werkt snel en is ook snel uitgewerkt. Tijdens het toedienen wordt er naar een balans gestreefd in dosering waarbij u wel zelfstandig blijft ademen maar niets mee krijgt van het onderzoek.

Eten, drinken en medicijnen

- Gebruikt u medicijnen? U moet deze gewoon innemen, behalve als het anders is afgesproken met uw sedatie praktijk specialist. U mag hierbij eventueel een slokje water drinken.
- Eten: u mag minimaal 6 uur voor het onderzoek of de ingreep niets meer eten.
- Drinken: tot maximaal 2 uur voor het onderzoek of de ingreep mag u alleen heldere vloeistoffen drinken zoals koffie (zonder melk of melkpoeder), thee (zonder melk of melkpoeder) en water, maar geen melkproducten, vruchtensappen of alcohol. Daarna mag u niets meer drinken.
- Er zijn een aantal onderzoeken waarvoor u langer nuchter moet zijn, mocht het voor u afwijken dan wordt dit voorafgaand met u besproken door u behandelaar.

Wat gebeurt er tijdens de sedatie

- U krijgt het slaapmiddel Propofol via een infuus in uw hand of arm door de sedatie praktijk specialist toegediend.

- U krijgt extra zuurstof via een zuurstofbril in uw neus toegediend.
- De sedatie praktijk specialist controleert tijdens het onderzoek of behandeling steeds de diepte van de slaap, uw ademhaling, uw hartritme en uw bloeddruk.
- Zo nodig krijgt u ook een pijnstillers.

Na het onderzoek

Na het onderzoek of behandeling brengen wij u naar de uitslaapruiimte. U blijft hier onder controle tot u wakker bent. Als u goed wakker bent, verwijderen wij het infuus. Indien het onderzoek of de behandeling het toelaat kunt u met uw begeleider naar huis of terug naar de afdeling waar u bent opgenomen.

Let op

- U mag na het onderzoek of de behandeling niet zonder begeleiding naar huis. Zorg dat iemand met u meekomt naar het ziekenhuis, of dat iemand u ophaalt na het onderzoek of de behandeling. Als dit niet geregeld is kan het onderzoek of behandeling helaas niet doorgaan.
- Wij noteren altijd de naam en het telefoonnummer van uw begeleider. Uw begeleider mag wachten in de wachtruimte, maar dat hoeft niet. Uw begeleider kan naar de uitslaapkamer bellen om te vragen wanneer u kunt worden opgehaald.

- U mag tot 24 uur na toediening van de sedatie niet deelnemen aan het verkeer, niet werken en geen alcohol drinken.
- Neem deze dag geen belangrijke beslissingen, omdat u vergeetachtig kunt zijn.

Bijwerkingen

- Soms misselijkheid. Als het nodig is krijgt u een medicijn.
- Soms sufheid tot enkele uren na de sedatie.
- Problemen met de ademhaling/hartfunctie tijdens het onderzoek of behandeling. Indien nodig bieden wij u directe ondersteuning mocht dit zonder resultaat zijn dan is het mogelijk dat de sedatie gestopt moet worden. Dit komt echter zelden voor.

Uitstel van het onderzoek of behandeling

Houdt er rekening mee dat het altijd mogelijk is dat een onderzoek of behandeling wordt uitgesteld door onvoorziene omstandigheden. Uiteraard stellen wij alles in het werk om u zo snel mogelijk te behandelen.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over de sedatie, neem dan contact op met de afdeling Preoperatieve Screening van maandag tot en met vrijdag 08.30-16.00 uur via (010) 291 12 18.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21

3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

