

# PATIËNTEN INFORMATIE

## Rituximab

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



In deze folder vindt u informatie over de behandeling met het middel rituximab. Het doel van een behandeling met rituximab is het ontstekingsproces tot rust te brengen.

### **Werking van rituximab**

Rituximab is een geneesmiddel dat bepaalde witte bloedcellen (de B-lymfocyten) tijdelijk uitschakelt. Deze B-lymfocyten maken deel uit van het afweersysteem. Het zijn verdedigers tegen ongewenste infecties. Ze spelen ook een rol bij verschillende auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis en SLE. Bij deze ziekten kan er sprake zijn van een overmatige activiteit van de B-lymfocyten. Vermindering van het aantal B-lymfocyten kan daarom de ziekte tot rust brengen.

### **Wanneer wordt rituximab voorgeschreven?**

Rituximab wordt (meestal in combinatie met methotrexaat) gebruikt voor de behandeling van actieve reumatoïde artritis. Rituximab kan voorgeschreven worden aan patiënten bij wie andere geneesmiddelen onvoldoende zijn aangeslagen.

Voorafgaand aan de behandeling met rituximab dient onderzocht te worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit houdt in dat u gescreend wordt op een doorgemaakte TBC en hepatitis infectie in het verleden.

### **Het gebruik van rituximab**

Het toedienen van rituximab vindt plaats in het ziekenhuis en gebeurt door middel van een infuus. Dit infuus neemt gemiddeld 4 à 5 uur in beslag. De eerste behandeling met rituximab bestaat uit 2 infusen, gegeven met een interval van 2 weken. Afhankelijk van de mate van de ziekteactiviteit wordt meestal na 6-12 maanden opnieuw tweemaal een infuus toegediend.

Rituximab werkt langzaam in. Daarom duurt het enkele weken voordat u het effect merkt. De behandeling met rituximab wordt meestal gecombineerd met methotrexaat, prednison of een ander antireumaticum.

Gedurende het infuus worden uw bloeddruk, pols, hartslag en temperatuur regelmatig gecontroleerd. Ook wordt er meestal bloed afgenomen voor controle. U kunt de uitslagen van het bloedonderzoek opvragen bij uw arts als u de polikliniek bezoekt.

### **Bijwerkingen van rituximab**

Indien er een ongewenste reactie of bijwerking optreedt, gebeurt dit meestal tijdens het inlopen van het infuus.

- Mogelijke bijwerkingen/reacties tijdens het infuus zijn:  
jeuk, kortademigheid, koorts, rillingen, huiduitslag en/of bloeddrukschommelingen.  
Om de kans op bijwerkingen te verkleinen, worden voorafgaand aan ieder infuus, een anti-allergiemiddel, prednison en paracetamol toegediend. Mocht u toch last krijgen van de bijwerkingen, dan kan de toediening van rituximab vertraagd of onderbroken worden.
- Patiënten die rituximab gebruiken, hebben een iets grotere kans op infecties. Neem daarom altijd de temperatuur op wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, bijvoorbeeld een pussend wondje, altijd contact op met uw reumatoloog.

### **Belangrijk**

Een zeldzame maar ernstige bijwerking van rituximab is het optreden van een herseninfectie. Mocht u last hebben van één of meerdere van de volgende symptomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

- geheugenverlies;
- moeite met nadenken;
- moeite met lopen;
- vermindering/verlies van gezichtsvermogen.

### **Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding**

Over het gebruik van rituximab tijdens zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend. Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog. Vanwege

de lange werkingsduur van rituximab geldt dit tot 12 maanden na uw laatste behandeling met rituximab.

### **Vaccinaties**

Vaccinatie moet minstens 4 weken voor de eerste behandeling met rituximab plaatsvinden. De griepvaccinatie (griep prik) wordt geadviseerd bij rituximab en mag worden toegediend. We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

### **Operaties en andere ingrepen**

Op theoretische gronden bestaat er bij het gebruik van rituximab een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing. Algemeen is het advies om niet eerder dan 3 maanden na de laatste rituximab toediening een (geplande) operatie (of andere ingreep) te ondergaan. Met de volgende rituximab toediening dient gewacht te worden totdat de wond genezen is

### **Gebruik van medicatie tijdens behandeling met rituximab**

Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie. Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Licht uw arts in over uw behandeling met rituximab en vertel wanneer u het laatste infuus heeft gehad

### **Vragen**

Als u naar aanleiding van deze folder vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan uw reumatoloog of reumaconsulent. Iedereen die start met een biological krijgt een afspraak bij de reumaconsulent.

Heeft u dringende vragen neem dan contact op met de polikliniek Reumatologie via (010) 291 22 05.

Heeft de vraag geen spoed dan kunt u uw vraag ook stellen via het zorgportaal 'Mijn Maasstad Ziekenhuis' via onze website.

## Notities

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،  
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه  
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21

3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

E: [info@maasstadziekenhuis.nl](mailto:info@maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl) / [www.maasnik.nl](http://www.maasnik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

