



## Patiënteninformatie Behandeling aneurysma spurium

### Algemeen

Door middel van deze brief wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over een behandeling van een aneurysma spurium. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

### Wat is een behandeling van een aneurysma spurium?

Een aneurysma spurium is een bloeduitstorting die in verbinding staat met een slagader. Deze ontstaat soms in de lies na een katheterisatie, waarbij de aangeprikte slagader blijft lekken.

Met behulp van echografie wordt gekeken of er een aneurysma spurium aanwezig is.

Er wordt geen röntgenstraling gebruikt.

Als er inderdaad sprake is van een aneurysma spurium, wordt geprobeerd de lekkage tussen de slagader en de bloeduitstorting te dichten.

### Vorbereiding

- Wij adviseren u geen waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis.
- Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.

### De behandeling

De lies wordt met gel ingesmeerd, waarna een klein apparaatje (transducer) over uw lies heen en weer wordt geschoven. Deze transducer zendt en ontvangt geluidsgolven, waardoor eventuele afwijkingen af te beelden zijn. Als er sprake is van een aneurysma spurium wordt via een dunne naald een kleine hoeveelheid vloeistof in het aneurysma spurium gespoten. Deze vloeistof (Tisseel) dicht de lekkage tussen de slagader en de bloeduitstorting.

### Na de behandeling

Indien u nog niet bent opgenomen, moet u na de behandeling wel opgenomen worden.

Het is namelijk belangrijk dat u na de behandeling bedrust houdt. De volgende dag wordt met behulp van een echografie gekeken of de lekkage uit de slagader blijvend gestopt is.

Verdere informatie krijgt u van de arts op de verpleegafdeling.

### Tot slot

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of de röntgenlaborant(e).