

PATIËNTEN INFORMATIE

Wekadvies kind

Na een val op hoofd
bij kinderen tot 6 jaar

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



U bent met uw kind bij de Spoedeisende Hulp geweest, omdat uw kind hard op zijn hoofd is gevallen of hard zijn hoofd heeft gestoten. Uw kind mag nu naar huis. Het is belangrijk dat u uw kind regelmatig controleert. Deze folder geeft u uitleg waar op u moet letten.

De eerste 24 uur

- Laat de eerste 24 uur uw kind niet alleen. Controleer overdag en 's nachts de eerste zes uur om het uur en daarna om de twee uur (tot 24 uur na het trauma) of uw kind goed aanspreekbaar blijft. Goed aanspreekbaar betekent dat uw kind op u reageert zoals hij normaal ook reageert, bijvoorbeeld: hij herkent u, hij kan eenvoudige vragen beantwoorden of huilt als hij zich bezeert.
- Zorg dat u, als het nodig is, naar de huisarts of Spoedeisende Hulp kunt gaan.



De eerste 2 dagen kunnen zich de volgende problemen voordoen

- Hoofdpijn: Als u met de arts heeft gesproken mag u om de 6 uur paracetamol geven om de pijn te verminderen. Houdt daarbij de maximale dosering aan die op het doosje staat.
- Overgeven: Uw kind mag maximaal 3 keer braken in de eerste 2 uur na de val.
- Slaperigheid: Meteen na de val kan uw kind slaperig zijn. Hij mag gewoon gaan slapen, maar wek hem de eerste zes uur om het uur en daarna om de twee uur (tot 24 uur na het trauma).

Wanneer moet u een arts waarschuwen?

Neem contact op met de dienstdoende huisarts of met de Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99 als uw kind:

- een verminderd bewustzijn heeft;
- zich heel anders gedraagt dan normaal;
- hoofdpijn blijft houden (baby's zijn dan zeer prikkelbaar);
- blijft overgeven;
- steeds slaperiger wordt;
- niet stopt met huilen;
- rare bewegingen maakt die u ongerust maken;
- moeilijk kan lopen, praten of zien.

De komende weken kunnen zich de volgende problemen voor doen

Sommige problemen na een lichte hersenschudding zijn in het begin moeilijk te herkennen.

Uw kind kan:

- snel uit zijn humeur zijn;
- wisselde stemmingen hebben;
- erg moe zijn;
- problemen hebben met de concentratie;
- tijdelijk ander gedrag vertonen dan voor de hersenschudding.

Bespreek het met uw huisarts als u zich zorgen maakt. De meeste kinderen met een hersenschudding worden helemaal beter.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze gerust aan uw behandelend arts of de verpleegkundig(e) specialist van de Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

