

PATIËNTEN INFORMATIE

Urokinase behandeling

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Uw arts heeft voorgesteld om een behandeling met urokinase te ondergaan. Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over deze behandeling.

Doel van de behandeling

Een urokinase behandeling wordt voorgeschreven aan patiënten bij wie een (slag-) ader of bypass is afgesloten door een bloedstolsel. Urokinase kan dit stolsel oplossen, waardoor de bloedcirculatie verbetert. In deze folder wil Maasstad Ziekenhuis u informeren over deze behandeling.

De behandeling

De behandeling vindt plaats op de afdeling Chirurgie. U vindt de afdeling in bouwdeel J op de tweede etage.

U kunt de behandeling ook op de afdeling Cardiac Care Unit (CCU)/Medium Care Unit (MCU) krijgen. U vindt deze afdelingen in bouwdeel G op de tweede etage.

De verpleegkundige dient u het medicijn toe op voorschrift van de arts. U krijgt de urokinase via een katheter (een dun plastic slangetje) in uw lies. Eerst wordt uw lies verdoofd. Vervolgens schuift de arts de katheter vanuit de slagader in uw lies op tot in of vlak voor het stolsel in uw bloedvat. Het is van groot belang dat u tijdens de toediening van de urokinase plat op uw rug blijft liggen, met gestrekte benen. De katheter ligt immers in een slagader.

Wanneer u naar het toilet moet krijgt u een urinaal, po of er wordt een urinekatheter ingebracht. Tijdens de behandeling druppelt de urokinase continu via een infuuspomp in uw bloedbaan.

Een of meerdere keren per dag worden er röntgenfoto's gemaakt met behulp van contrastvloeistof om te kijken of het stolsel kleiner wordt. Een verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk en polsslag. Hij of zij controleert daarnaast of de katheter goed zit (niet nabloedt) en beoordeelt de bloeddorstroming van het afgesloten lichaamsdeel. Ook wordt er tijdens de behandeling regelmatig bloed bij u afgenomen. Tijdens de behandeling mag u eten en drinken mits de arts anders afspreekt.

De duur van de behandeling kan variëren van enkele uren tot dagen, dan wordt bekeken of het stolsel voldoende is opgelost. Als dat niet het geval is, kan de arts met u besluiten tot een operatie over te gaan.

Als de urokinase behandeling is afgerond, haalt de arts de katheter uit uw lies. Hierna moet u zes uur plat liggen voordat u weer mag mobiliseren. Als u een angioseal krijgt (een soort plugje dat de insteekopening in de slagader dichtdrukt), dan is meestal drie uur bedrust voldoende. De angioseal lost vanzelf na drie maanden op.

Naast de urokinase krijgt u heparine toegediend. Dit middel zorgt ervoor dat het bloed na de behandeling door uw hele lichaam dun blijft. Dit middel krijgt u via een infuus in uw arm.

Na de behandeling

Na de urokinase behandeling krijgt u nog een paar dagen de bloedverdunners Sintrom (acenocoumarol, tabletvorm) en Heparine toegediend via een infuus totdat uw bloed dun genoeg is. Indien u Sintrom gebruikt komt u onder controle van de Trombosedienst, de Heparine wordt gestopt zodra u wordt ontslagen uit het ziekenhuis.

Naar huis

Zodra uw bloed dun genoeg is, mag u het ziekenhuis verlaten. U krijgt tabletten Sintrom mee naar huis. Uw arts of verpleegkundige vertelt u welke dosis u moet gebruiken. De trombosedienst begeleidt u verder.

Risico's van de urokinase behandeling

Het voornaamste risico van de behandeling zijn spontane bloedingen als gevolg van het stolsel oplossend effect van urokinase. Deze bloedingen kunnen in principe in ieder deel van het lichaam optreden. De voor- en nadelen (de risico's) van de urokinase behandeling worden door de arts met u besproken.

Vragen

Hebt u nog vragen over de behandeling? Stelt u deze dan gerust aan een verpleegkundige of aan uw behandelend arts. U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Chirurgie 1 via (010) 291 34 69.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

